СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 10. 1861.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: О РАЗВЕДЕНІИ КЛЕВЕРА. — О СБЕРЕЖЕНІИ ЯБЛОКОВЪ ВЪ ПРОКЪ.

О РАЗВЕДЕНІИ КЛЕВЕРА.

Изъ многихъ извѣстныхъ въ земледѣліи видовъ клевера преимущественно два: красный и бѣлый, разводятся въ большомъ видѣ, какъ отличныя кормовыя травы:

Клеверъ (Trifolium), называемый также *дятловиною, кашкою* и *луговымъ трилистникомъ*, есть многолѣтняя трава, употребляемая на кормъ скоту.

Красный клеверъ (T. pratense) не вездѣ растетъ съ одинакимъ успѣхомъ, но за то въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ почва способствуетъ его разведенію и погода ему благопріятствуетъ, разведеніе его выгоднѣе другихъ кормовыхъ травъ.

Красный клеверъ родится всего лучше, на плодородной, глинистой землѣ, съ примѣсью извести и песка, ежели притомъ лѣто бываетъ довольно сыро и не слишкомъ жарко; на легкой, но не тощей, землѣ онъ растетъ изрядно только въ мокрые годы, а на тощей землѣ вовсе не удается. Равнымъ образомъ разведеніе краснаго клевера безуспѣшно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ лѣто бываетъ сухое и жаркое, если даже сѣять его на самой лучшей землѣ.

Бѣлый клеверъ (T. repens) разводится вообще также какъ красный, но родится и на сухой песчаной, довольно тощей землѣ, на мѣстахъ нѣсколько возвышенныхъ, гдѣ красный клеверъ родился бы дурно. На плодородной и сыроватой землѣ выгоднѣе, однако, сѣять красный клеверъ, потому что бѣлый на ней никогда не даетъ такого урожая сѣна, какой можетъ получить отъ краснаго. Взамѣнъ того, бѣлый клеверъ довольствуется меньшимъ удобреніемъ, долѣе не пропадаетъ и рѣдко производитъ опасное раздутіе желудка у животныхъ. По этимъ качествамъ онъ пріобрѣтаетъ большое значеніе для пастбищъ, особенно на сухой, легкой почвѣ, а потому его выгоднѣе разводить для выгона, чѣмъ для укоса; онъ сте-

лится по землѣ, а отъ этого неудобно бываетъ косить его.

Такъ какъ сѣмена бѣлаго клевера мелки, то на десятину достаточно сѣять его отъ 20 до 30 фунтовъ. Зрѣлыя сѣмена бѣлаго клевера имѣютъ желтый цвѣтъ.

Бѣлый клеверъ можно косить только одинъ разъ въ лѣто и сѣна получается на хорошей землѣ не болѣе половины противъ краснаго клевера; но за то сѣно бѣлаго клевера нѣжнѣе, питательнѣе и вкуснѣе для скота.

Клеверъ не даетъ укоса въ тотъ годъ, когда былъ посѣянъ, потому что до осени высоко не выростаетъ. По этому, его никогда не сѣютъ отдѣльно, а всегда съ какимъ нибудь другимъ растеніемъ: съ яровою пшеницею, яровою рожью, ячменемъ, овсомъ, льномъ или по озими. Подъ хлѣбъ, съ которымъ предполагается сѣять клеверъ, надобно обработать пашню такъ, какъ бы собственно подъ клеверъ.

Клеверъ пускаетъ корни свои глубоко въ землю, а потому надобно пахать ее вершка на четыре глубины. Такъ какъ клеверъ родится хорошо только на плодородной почвѣ, то хорошаго урожая можно ожидать только тогда, когда его сѣютъ не позже втораго года послѣ хорошаго удобренія; на третій или четвертый годъ послѣ удобренія онъ хорошо родится только тогда, когда удобреніе было весьма обильно, или же когда почва сама по себѣ очень плодородна, какъ напримѣръ, на черноземѣ. При обработкѣ пашни подъ посѣвъ клевера, кромѣ глубокаго разрыхленія, необходимо еще стараться истребить сорныя травы.

Ежели предполагается сѣять клеверъ по яровому, то пахать надобно поглубже еще съ осени, пуская соху за сохой, а еще лучше углубитель за плугомъ по одной и той же бороздѣ. Отъ этого корни сорныхъ травъ зимою вымерзаютъ, когда пласты были порядочно прохвачены морозами. Весною, какъ скоро земля просохнетъ, надобно сильно боронить землю острыми желѣзными боронами. Послѣ такой обработки можно сѣять тѣ яровые хлѣба, которые вообще сѣютъ раньше весною, напримѣръ овесъ и яровую рожь. Посѣвъ слѣдуетъ запахать и потомъ заборонить. Тотчасъ послѣ бороньбы надобно сѣять клеверъ и нѣсколько дней спустя, когда покажутся всходы хлѣба, въ сухую погоду, и отнюдь не въ дождь, укатать каткомъ для того, чтобы сѣмена клевера вдавались въ землю, а также, и для того, чтобы на другой годъ было бы удобнѣе косить клеверъ и грести сѣно. Впрочемъ, въ сухую погоду посѣвъ клевера иногда слегка забораниваютъ или заволакиваютъ, чтобы глубже прикрыть сѣмена, а въ сырую оставляютъ вовсе безъ прикрытія. Такъ какъ, при раннемъ посѣвѣ, земля бываетъ еще довольно сыра, то посѣянные хлѣба всходятъ скоро и часто, покрывая землю своею зеленью, заглушаютъ сорныя травы, ежели онѣ появляются. Всходы клевера появляются позже всходовъ хлѣба и до осени перваго года растутъ медленно.

Подъ пшеницу, ячмень и ленъ, по которымъ предполагается сѣять клеверъ, надобно перепахать землю весною до посѣва ихъ. Въ этомъ случаѣ осеннюю пашню можно иногда боронить

и осенью для того, чтобы весною можно было перепахать поле раньше, какъ только земля достаточно просохнетъ. Перепаханное весною поле слѣдуетъ оставить въ покоѣ, примѣрно на недѣлю или на полторы, для того, чтобы дать время землѣ провянуть, а сорнымъ травамъ взойти или, по крайней мѣрѣ, пустить ростки. Какъ только это станетъ замѣтно, то должно боронить пашню, отчего всходы и ростки сорныхъ травъ истребляются. Бороньбу кончить надобно недѣли за полторы до посѣва для того, чтобы вторично дать время взойти сѣменамъ сорныхъ травъ, которые паханьемъ и бороньбою при посѣвѣ будутъ уже окончательно истреблены. Послѣ этого, въ свое время должно сѣять хлѣба и по нимъ клеверъ, какъ было сказано выше. При такой обработкѣ земли и хлѣбъ будетъ родиться хорошо и клеверъ на слѣдующій годъ будетъ надеженъ.

Гдѣ садится картофель на полѣ и на другой годъ послѣ него предполагается сѣять яровое съ клеверомъ, тамъ осенью, послѣ уборки картофеля, пахать не нужно. Равнымъ образомъ и весною, до посѣва хлѣба съ клеверомъ, не всегда бываетъ нужно перепахивать землю, потому что она бываетъ уже достаточно разрыхлена и сорныя травы на ней бываютъ истреблены отъ двоекратнаго или троекратнаго окучиванія картофеля. Въ такомъ только случаѣ необходимо бываетъ пахать и боронить землю весною до посѣва, когда окажется, что земля, по стаяніи снѣга, сильно слеглась и окрѣпла. Клеверъ особенно хорошо родится послѣ картофеля, когда подъ него было положено сильное удобреніе и вообще земля достаточно плодородна.

Клеверъ, посѣянный по яровому, иногда худо всходитъ, если весною во время посѣва долго стоитъ сухая погода. По этому, особенно на легкихъ почвахъ, надежнѣе сѣять клеверъ по озими, потому что къ посѣву его можно приступить раньше, когда земля еще сыра или даже мокра. Въ этомъ случаѣ необходимо поле подъ озимь вытроить; тогда клеверъ сѣется не вмѣстѣ съ рожью, какъ это дѣлается по яровому, а въ слѣдующую весну по озимымъ всходамъ, въ ту пору, когда сѣвецъ уже не вязнетъ на полѣ, или даже еще ранѣе, какъ только сойдетъ снѣгъ, а земля еще не оттаетъ.

На засѣвъ одной казенной десятины надобно сѣмянъ краснаго клевера отъ 30 до 40 фунтовъ. Сѣмена высѣваются въ разбросъ, по предварительномъ смѣшеніи съ 2 четвериками песка, для болѣе равномѣрнаго разбрасыванія. Впрочемъ, искусный сѣвецъ не нуждается въ этой примѣси. Урожай сѣна бываетъ лучше, когда къ сѣменамъ краснаго клевера примѣшивать нѣсколько сѣмянъ бѣлаго клевера, или тимофеевки, полагая на 30 фунтовъ 5 фунтовъ примѣси. Примѣсь тимофеевки, кромѣ того, содѣйствуетъ скорѣйшему высыханію укоса. При многопольномъ хозяйствѣ, въ которомъ на цѣломъ полѣ разводится картофель и предполагается сѣять клеверъ, весьма выгоденъ слѣдующій порядокъ посѣвовъ: въ первый годъ картофель, по сильному удобренію, на второй годъ яровое съ клеверомъ, который родится отлично хорошо; на третій годъ будетъ укосъ клевера; на четвертый паръ съ посѣвомъ

озими; наконецъ на пятый годъ рожь. При такомъ пятипольномъ сѣвооборотѣ не нужно даже удобрять подъ озимь, если только клеверъ былъ густъ, высокъ и чистъ отъ сорныхъ травъ, потому что отъ такого клевера земля не истощается, а даже нѣсколько удобряется отъ опадающихъ листьевъ и отъ толстыхъ корней, которые въ землѣ перегниваютъ. Клеверъ, при этомъ сѣвооборотѣ, можно оставлять даже на два года для укоса, т. е. и на тотъ годъ, въ которомъ назначенъ былъ паръ; въ этомъ случаѣ надобно косить его не позже Петрова дня, потомъ тотчасъ вспахать паровое поле, боронить чрезъ двѣ недѣли и сѣять озимь въ свое время. Земля будетъ достаточно рыхла и мягка, ежели укосъ клевера былъ удовлетворителенъ.

Надобно замѣтить, что красный клеверъ родится не хорошо, если сѣять его ранѣе 6 лѣтъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Однажды посѣянный, онъ можетъ давать хорошіе укосы, смотря по мѣстности, въ теченіи двухъ или трехъ лѣтъ. По этому, надобно устроить такъ, чтобы половина поля, назначеннаго подъ посѣвъ травы, была засѣяна клеверомъ, а другая какою нибудь другою травою, напримѣръ тимофеевкою; когда же очередь опять дойдетъ до посѣва травы, то на той части поля, на которой росъ клеверъ, надобно посѣять тимофеевку, а на той, на которой росла тимофеева трава, посѣять клеверъ.

Выше было сказано, что клеверъ въ первый годъ растетъ медленно. По этому, осенью, послѣ уборки хлѣба, по которому былъ посѣянъ клеверъ, не стоитъ его косить; но иногда онъ и въ первый годъ выростаетъ довольно хорошо, особенно въ мокрое лѣто; однако и въ этомъ случаѣ въ первомъ году не слѣдуетъ его ни косить, ни стравливать скотомъ, потому что отъ этого онъ легко можетъ вымерзнуть. На другой годъ, весною, когда зелень клевера станетъ прикрывать землю, весьма полезно посыпать его мелко истолченнымъ гипсомъ (алебастромъ), полагая по 20—30 пуд. на десятину. Отъ этого ростъ клевера замѣтно улучшается, особенно въ сырую погоду. Посыпку алебастромъ должно производить такъ, чтобы онъ приставалъ къ листьямъ молодаго клевера, а потому это дѣлается рано утромъ, во время росы, или же въ пасмурный и сырой день, но только не предъ дождемъ, который скоро смываетъ алебастръ съ листьевъ клевера. Къ алебастру полезно примѣшивать золу и, если имѣется, птичій пометъ. Въ мѣстахъ, гдѣ алебастръ достать трудно, или гдѣ онъ очень дорогъ, можно съ выгодою замѣнить его растворомъ купороснаго масла (сѣрной кислоты) въ водѣ, полагая 4 фунта кислоты на 57 ведеръ воды на десятину. Этимъ растворомъ спрыскиваютъ всходы клевера рано весною.

Клеверъ на сѣно надобно косить тогда, когда разцвѣтутъ всѣ головки: ежели косить его раньше, то не будетъ полнаго сбора сѣна; ежели же косить позже, то сѣно будетъ жестко, потому что послѣ цвѣтенія стебли клевера твердѣютъ. Покосъ надобно стараться производить въ хорошую погоду.

Клеверъ можно косить два раза въ одно лѣто, особенно когда послѣ перваго укоса стояла сырая погода; въ два укоса на порядочной землѣ

можно собрать сѣна съ десятины около 300 пудовъ; но на очень плодородной землѣ, въ сырое лѣто и особенно когда клеверъ посѣянъ былъ послѣ картофеля, можно собрать въ одинъ укосъ даже до 400 пудовъ сѣна. Клеверъ даетъ полный урожай на второй и третій годъ послѣ посѣва; на четвертый годъ, какъ сказано выше, онъ начинаетъ уже пропадать; по этому если поле должно долѣе остаться подъ травою, то при посѣвѣ клевера необходимо прибавлять сѣмянъ злаковъ.

Сушка клевера не такъ проста, какъ сушка луговаго сѣна; она требуетъ осторожности и вниманія, безъ чего листья клевера обламываются, т. е. пропадаютъ самыя питательныя части сѣна. Въ лѣсистыхъ мѣстахъ, гдѣ жерди и колья не дороги, сушка на козлахъ бываетъ самая легкая и выгоднѣйшая, потому что ей дожди мало мѣшаютъ и листья у клевера не обламываются. Этотъ способъ сушки производится слѣдующимъ образомъ:

За день или за два до наступленія времени косьбы, надобно ставить козлы, распредѣляя ихъ по всему полю такъ, чтобы не нужно было далеко переносить скошенный клеверъ. Для этого на назначенныхъ мѣстахъ вколачиваютъ въ землю отъ 5 до 7 или болѣе кольевъ, въ одинъ рядъ, колъ отъ кола примѣрно на сажень: колья должны быть длиною до $4^1/_2$ аршинъ и толщиною въ вершинѣ 2 вершка. Каждый колъ по длинѣ долженъ имѣть по три пары маленькихъ колышковъ, вколоченныхъ въ него съ обѣихъ сторонъ или же, что еще лучше, по три пары сучковъ, длиною до 4-хъ вершковъ и въ разстояніи пара отъ пары около $^3/_4$ аршина, считая съ вершины кола. Колышки эти назначены для накладки на нихъ жердей. Когда колья вколочены въ землю, то по обѣимъ сторонамъ ихъ вколачиваются въ землю вилки, высотою отъ земли на аршинъ и въ разстояніи отъ кольевъ на $^1/_2$ аршина. На эти вилки накладываются перекладины, толщиною въ 1 вершокъ, а на перекладины кладутся жерди по парѣ на каждой сторонѣ. На эти жерди, какъ на скамью, накладывается первый слой скошеннаго клевера Чтобы сильный вѣтеръ не опрокинулъ козелъ, когда на нихъ наложенъ клеверъ, нужно сдѣлать подпоры по обѣимъ сторонамъ кола, или же по крайней мѣрѣ средняго и двухъ крайнихъ. Верхніе концы подпоръ привязываютъ къ вершинамъ кольевъ, такъ чтобы эти концы вмѣстѣ съ тѣмъ служили и для верхней пары жердей; нижніе концы подпоръ крѣпко упираютъ въ землю. Первый слой клевера, который накладывается на скамью, долженъ доходить до первой пары колышковъ и имѣть въ ширину до 2-хъ аршинъ, такъ чтобы они нѣсколько свѣшивались по обѣ стороны скамьи. Потомъ, съ каждой стороны кольевъ кладутъ на колышки по одной жерди, на жерди опять накладываютъ слой клевера до слѣдующей пары колышковъ и такъ далѣе до самой вершины кольевъ, по обѣ стороны которой также кладется пара жардей и покрывается послѣднимъ слоемъ клевера.

Клеверъ складывать на козлы въ тотъ же день, когда онъ скошенъ, лишь бы онъ не былъ мокръ отъ дождя или росы. О дальнѣйшей сушкѣ его на козлахъ уже нечего заботиться,

потому что онъ самъ, безъ всякой помощи, въ двѣ недѣли высыхаетъ и дастъ совершенно зеленое сѣно, потому что дождь обыкновенно не проходитъ въ слои, бока которыхъ сложены отвѣсной стѣной. Клеверъ, положенный на козлы въ совершенно зеленомъ видѣ, ни сколько не прѣетъ, потому что слои его, по мѣрѣ усыханія, осѣдаютъ, отъ чего подъ каждою парою жердей образуется пустота, по которой вѣтеръ свободно проходитъ.

При сушкѣ клевера на подобныхъ козлахъ, листья его не осыпаются. Его можно не трогать до осени; но во всякомъ случаѣ еще до снѣга надобно сложить его въ сараи или смѣтать въ стоги. Съ семи промежковъ козелъ обыкновенно накладывается пять возовъ сухаго сѣна. Послѣ уборки сѣна надобно убрать съ поля и самые козлы. Колья и жерди должно сохранять въ такомъ мѣстѣ, гдѣ они не могутъ гнить; при такомъ порядкѣ они прослужатъ лѣтъ десять; только колья придется перемѣнять скорѣе, потому что концы ихъ, каждый годъ находясь въ сырой землѣ, во время сушки клевера, гніютъ скорѣе.

Въ безлѣсныхъ странахъ, гдѣ заготовленіе жердей и кольевъ стоитъ слишкомъ дорого, надобно сушить клеверъ слѣдующимъ образомъ. Скошенный клеверъ должно оставить на день или на два въ валахъ, потомъ переворотить нижнею стороною ихъ граблевищемъ, а когда просохнетъ и эта сторона, то опять сверху переворотить весь валъ. При сухой и теплой погодѣ двухъ поворотовъ обыкновенно достаточно для совершеннаго высыханія сѣна; но въ сѣверномъ хозяйствѣ нельзя разсчитывать на постоянство погоды, а потому при третьемъ поворачиваніи два вала соединяютъ вмѣстѣ или образуютъ изъ нихъ небольшія копны. Поворачивать сѣно лучше всегда утромъ, тотчасъ послѣ росы, ибо въ знойное время дня легко обсыпаются листья.

Есть еще третій способъ сушки, который состоитъ въ слѣдующемъ: скошенный клеверъ и пролежавшій день или два въ валахъ переворачиваютъ на другую сторону, какъ было сказано выше, при второмъ способѣ. На слѣдующій день клеверъ складывается въ небольшія копны и оставляется въ нихъ до тѣхъ поръ, пока онъ не начнетъ согрѣваться. Когда онъ согрѣется, то надобно тотчасъ разбить его копны и окончательно высушить сѣно, переворачивая его. Клеверъ вообще сохнетъ медленно, такъ какъ стебли его весьма сочны; однако, при третьемъ способѣ онъ сохнетъ скорѣе, нежели при второмъ, т. е. въ 5 или 6 дней; но этотъ способъ неудобенъ при наступленіи продолжительныхъ дождей въ то время, какъ клеверъ согрѣвается въ копнахъ.

Для того, чтобы узнать совершенно ли просохло клеверное сѣно, берутъ нѣсколько стеблей его и крутятъ ихъ какъ можно крѣпче; если при этомъ изъ нихъ покажется хотя малѣйшій сокъ, то это значитъ, что сѣно недостаточно сухо и что слѣдуетъ нѣсколько повременить метаніемъ въ скидры; если же въ стебляхъ, при крученіи ихъ, не покажется никакой сырости, то сѣно должно намедленно убирать. Въ сырую погоду, иногда случается, что сѣно не вполнѣ просохнетъ, или сметанное въ стоги

отволгнетъ; въ такомъ случаѣ, съ наступленіемъ сухой погоды, его разметываютъ и просушиваютъ снова. При непрерывной и продолжительной сырой погодѣ, второй укосъ клевера должно посолить скорѣе или скормить.

Посѣвъ клевера исключительно на сѣмена рѣдко производится; обыкновенно для полученія сѣмянъ отводятся изъ общихъ посѣвовъ небольшіе участки. Надобно замѣтить, что по сборѣ сѣмянъ почва истощается гораздо болѣе, чѣмъ при скашиваніи травы до ихъ созрѣнія. Въ виду этого обстоятельства, надлежитъ, во-первыхъ, на участкахъ, назначаемыхъ для сбора сѣмянъ, производить посѣвъ нѣсколько рѣже, именно высѣвать $^1/_3$ менѣе обыкновеннаго, и, во-вторыхъ, участки эти ежегодно замѣнять другими и впослѣдствіи удобрять ихъ сильнѣе. Лишнее удобреніе и трудъ, пожертвованный при добываніи сѣмянъ, вполнѣ вознаграждается, ибо покупка сѣмянъ клевера обходится довольно дорого: отъ 6 до 10 р. с. пудъ. На сѣмена надобно выбирать на полѣ такія мѣста, на которыхъ клеверъ ростетъ не слишкомъ густо и гдѣ нѣтъ сорныхъ травъ. Такой клеверъ должно оставить до осени, пока сѣмена не выспѣютъ. Зрѣлость сѣмянъ клевера узнается, когда головки его побурѣютъ, а стебли поблекнутъ и пожелтѣютъ. Еще вѣрнѣе зрѣлость можно узнать по самымъ сѣменамъ. Для этого срываютъ съ разныхъ кустовъ по нѣскольку головокъ и растираютъ въ рукахъ: если сѣмена имѣютъ цвѣтъ фіолетовый или желтовато-бурый, то это вѣрный признакъ зрѣлости. Сѣмена не поспѣватъ въ одно время: случается, что часть головокъ созрѣла, другая же только что зацвѣтаетъ; но это не должно останавливать жатву и лишь только на большей части поля замѣтны будутъ признаки зрѣлости, то должно приступить къ сбору.

На сѣмена клеверъ сжинается или скашивается по утру, послѣ росы, для того, чтобы головки его необсыпались. Сжатый клеверъ сушится въ снопикахъ, а скошенный въ валахъ дня три; потомъ клеверъ свозится въ закрытое отъ дождя мѣсто и въ сухое время молотится на току. (При этомъ полезно постилать парусину). При такой молотьбѣ сѣмена опадаютъ съ шелухою, въ которой зерно сидитъ такъ крѣпко, что его можно отдѣлить начисто только въ деревянныхъ ступкахъ.

При недостаткѣ способовъ къ отчисткѣ всѣхъ сѣмянъ, вороха клеверныхъ плодовъ (для совершенной просушки и предупрежденія гніенія) разсыпаютъ въ сухихъ мѣстахъ слоями и часто переварачиваютъ; совершенно просушенныя сѣмена окончательно очищаютъ отъ шелухи, или хранятъ въ мѣшкахъ до будущаго посѣва. Посѣвъ сѣмянъ въ шелухѣ столь же дѣйствителенъ, какъ и посѣвъ сѣмянъ очищенныхъ; но надобно замѣтить, что первыхъ требуется втрое болѣе, чѣмъ послѣднихъ. Очищенныя сѣмена также хорошо разсыпать въ сухихъ мѣстахъ слоями и по совершенной просушкѣ хранить въ мѣшкахъ, или еще лучше въ открытыхъ закромахъ.

Съ десятины краснаго клевера можно получить чистыхъ сѣмянъ отъ 20 до 30 пудовъ.

Доброта сѣмянъ узнается по полнотѣ ихъ и по цвѣту.

Послѣ перваго укоса клевера, можно и неоставлять его для втораго укоса, а вмѣсто того пасти на немъ скотъ; при этомъ, однако, надобно поступать осторожно, т. е. не выгонять на клеверное поле голодный скотъ или не пасти его рано утромъ, по росѣ: скотъ легко объѣдается имъ и можетъ околѣть отъ раздутіе брюха. Чтобы этого не случилось, надобно скотъ пасти сперва на другомъ выгонѣ, гдѣ трава менѣе сочна, а потомъ уже пускать его на клеверъ; но когда уже несчастіе случилось и клеверъ начинаетъ пучить у животныхъ брюхо, то необходимо тотчасъ больную скотину гонять почти до усталости, пока она не начнетъ испражняться или мочиться, или же тотчасъ больной влить въ горло бутылку воды, въ которой растворена горсть извести.

О СБЕРЕЖЕНІИ ЯБЛОКОВЪ ВЪ ПРОКЪ.

Для того, чтобы яблоки долго могли пролежать совершенно цѣлыми, надо соблюдать слѣдующія правила.

1. Не надобно давать яблокамъ перезрѣвать на деревьяхъ,—въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наливаться, или, какъ говорятъ садовники, потекать.

2. Такъ какъ яблоки бываютъ не одинакихъ сортовъ, именно одни изъ нихъ не могутъ ни какъ долго лежать, какъ бы ихъ не сберегали, другія могутъ сохраняться до половины зимы, третьи, наконецъ, могутъ пролежать до весны, то, при собираніи съ деревьевъ, не надобно складывать ихъ всѣ въ одно мѣсто безъ разбора, но разбирать и класть по сортамъ, а для этого, разумѣется, надо знать свойства яблокъ, чего черезъ два—три года можно достигнуть.

3. Лучшія яблоки тотчасъ, по сорваніи съ дерева, относить въ ледники и погреба и тамъ складывать бережно въ тесаныя кадки, въ которыхъ они должны оставаться до первыхъ зимнихъ холодовъ. Яблоки начинаютъ въ кадкахъ потѣть, испуская изъ себя влажность, которою они покрываются и которая служитъ къ сохраненію ихъ.

4. При наступленіи холодовъ въ глухую осень, вынимаютъ яблоки изъ кадокъ и, по отдѣленіи отъ нихъ всѣхъ, сколько нибудь попортившихся, перетираютъ оставшіяся полотенцами и пересыпаютъ по слойно просомъ, самымъ сухимъ и чистымъ овсомъ, или мелкою рѣзкою сухой соломы. Наполнивши всѣ кадки до верху и яблоками и овсомъ, переносятъ ихъ въ теплые погреба или ставятъ даже въ самыя сухія подполья и оставляютъ тамъ на всю зиму.

5. Такъ какъ, при всемъ стараніи и осторожности, нѣкоторыя яблоки загниваютъ и портятся, то, чтобы отъ нихъ и другія не портились, непремѣнно надобно каждый мѣсяцъ ихъ перебирать, загнившія отбрасывать и перетирать остающіяся вновь и засыпать, но уже свѣжимъ просомъ и овсомъ, и при томъ совершенно сухимъ.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Мая 25 дня 1861 года. Ценсоръ *Веселаго.*

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.