СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 12. 1861.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: О ТОМЪ, КАКЪ ИЗЪ ОСУШЕННАГО БОЛОТА СДѢЛАТЬ ЛУГЪ. — О РАЗВЕДЕНІИ ТОРИЦЫ. — О РАЗВЕДЕНІИ ТИМОФЕЕВОЙ ТРАВЫ. — ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ОГУРЕЧНЫХЪ ПЛЕТЕЙ.

О ТОМЪ, КАКЪ ИЗЪ ОСУШЕННАГО БОЛОТА СДѢЛАТЬ ЛУГЪ.

Сѣно составляетъ самый обыкновенный кормъ для домашняго скота. Крестьяне не кормятъ своего скота ни картофелемъ, ни брюквой, ни капустой, а даютъ ему только сѣно да солому. Это бы еще не бѣда, отъ того, что хорошее сѣно вкуснѣе и здоровѣе для скота всякой брюквы и картофеля. А то бѣда, что сѣна-то мало. Мы почти не воздѣлываемъ кормовыхъ травъ на поляхъ, а довольствуемся тѣмъ сѣномъ, которое выростетъ на лугахъ. Луговъ у насъ мало, отъ того и сѣна мало. Между тѣмъ земли при каждомъ имѣніи очень достаточно, а иногда и много; но только изъ этой земли значительная часть считается неудобною. Но если разсмотрѣть дѣло порядкомъ, то увидимъ, что изъ неудобной-то земли, напримѣръ изъ болотъ, не хитро сдѣлать удобную, напримѣръ лугъ.

Болото, разумѣется, прежде всего нужно осушить, а осушаютъ обыкновенно канавами. Тутъ главное дѣло въ томъ, чтобы спустить въ приличномъ мѣстѣ воду изъ болота. Для этого весной надо замѣчать—въ которую сторону течетъ вода по болоту. Когда это будетъ извѣстно, то лѣтомъ по самымъ низкимъ мѣстамъ болота копается большая канава для спуска воды изъ него, по тому же самому направленію, по которому текла весенняя вода. Одной канавой не осушить болота, особливо если оно порядочно велико; для этого нужны еще побочныя канавы, которыя проводили бы воду изъ всѣхъ частей болота въ главную канаву. Сколько нужно такихъ канавъ и гдѣ ихъ копать, это можно смѣкнуть при самомъ дѣлѣ, а за глаза совѣтывать нельзя отъ того, что болота бываютъ разныя и болото на болото не похоже. Не нужно только совсѣмъ до суха осушать болота, изъ котораго хотятъ сдѣлать лугъ, отъ того, что луговыя травы для хорошаго роста требуютъ сырости. Если подъ болотомъ почва глинистая, то ее нужно осушать сильнѣе, чѣмъ песчаную. Послѣ осуш-

ки болота, его надо выровнять, т. е. если есть ямины или рытвины, то ихъ засыпать, а если есть бугры или кочки, то снять ихъ.

Болота, какъ сказано уже, бываютъ разныя, а по тому нужно и разные способы употреблять для обращенія ихъ въ луга.

1. *Чистые луговые* или просто болотистые луга. Эти болота весною затопляются и вода стоитъ на нихъ очень долго. Они очень сыры и холодны, а потому производятъ однѣ кислыя болотныя травы, которыя и въ видѣ сѣна называются болотомъ. Въ мокрые годы на такихъ мѣстахъ нельзя и сѣна сушить, иногда даже и косить, а косятъ по льду. Такое болото нужно только осушить надлежащимъ образомъ и оно въ послѣдствіи безъ всякихъ хлопотъ превратится въ хорошій лугъ. Послѣ осушенія болотныя травы мало по малу станутъ выводиться, а на мѣсто ихъ выростутъ травы сладкія. Правда, что это дѣло само по себѣ не скоро сдѣлается; но кто хочетъ ускорить его, тотъ пусть засѣетъ осушенное болото сѣменами хорошихъ сладкихъ травъ. Посѣвъ травъ производится въ сентябрѣ; подъ посѣвъ не нужно пахать земли, а только бороновать ее нѣсколько разъ вдоль и поперегъ тяжелыми желѣзными боронами; посѣвъ ничѣмъ не прикрывается. Чтобы высѣянныя травы скорѣе и лучше росли, полезно удобрять засѣянное мѣсто. Если слой дерна толстъ и подъ нимъ еще есть черноземъ, то такое мѣсто лучше всего удобрять золою, которой на десятину идетъ 3—4 четверти, или сженой извѣстью, которой на десятину идетъ 20—25 пудовъ. Если же дернъ тонкій и вообще въ землѣ чернозема мало, то на удобреніе лучше употреблять обыкновенный хлѣвный навозъ. Навоза кладется вполовину противъ пашни. Удобрять нужно осенью, когда земля хорошо промерзнетъ и когда, значитъ, колеса телѣги не будутъ врѣзываться въ дернъ. Весной, когда навозъ совсѣмъ вымоетъ, солому и глыбы нужно собирать съ луга, чтобъ не засоряли его.

2. *Кочкарныя болота.* Здѣсь на кочкахъ растетъ мохъ и бѣлоусъ, приземистая береза и ольха, а между кочекъ въ углубленіяхъ, въ которыхъ вода не переводится въ продолженіе почти всего лѣта, растутъ болотныя травы, которыхъ однако нельзя косить. На этихъ болотахъ, послѣ осушенія ихъ, главную работу составляетъ истребленіе кочекъ. Кочки бываютъ мягкія и твердыя: мягкія состоятъ изъ одной земли, обросшей дерномъ, а въ твердыхъ находятся древесные или кустарные пни. Мягкія срѣзываются острыми заступами, а если онѣ не велики, то и косами, особо для этого приготовляемыми. Твердыя кочки снимаются тяпками и топорами. Если на болотѣ кочекъ немного и всѣ онѣ мягкія, то острымъ заступомъ разрѣзываютъ на каждой кочкѣ дернъ крестомъ, отворачиваютъ концы дерна, вынимаютъ изъ-подъ него землю, дернъ опять укладываютъ по прежнему и плотно приколачиваютъ къ землѣ. Когда такимъ образомъ всѣ кочки будутъ уничтожены, тогда съ болотомъ поступаютъ точно также, какъ сказано выше о чистыхъ луговыхъ болотахъ. Если же кочекъ на болотѣ много и между ними много твердыхъ, то для скорости снимаютъ ихъ съ дерномъ. Отъ этого происходятъ плѣшины, которыя сами собою

долго не заростаютъ, а потому надобно ихъ засѣвать сѣменами хорошихъ кормовыхъ травъ. Если кочекъ на болотѣ такъ много, что по снятіи ихъ большая часть его обнажается отъ дерна, то осенью вывозятъ на это мѣсто навозъ вполовину менѣе противъ полей, поднимаютъ и оставляютъ такъ до весны. Весной боронуютъ, высѣваютъ подъ борону ленъ или овесъ и вслѣдъ за тѣмъ высѣваютъ кормовыя травы. Такимъ образомъ удобренная и обработанная земля скоро превратится въ хорошій лугъ, а урожай овса или льна вознаградитъ хозяина за работу.

Травяныхъ сѣмянъ на посѣвъ не надобно жалѣть, потому что чѣмъ гуще будетъ сдѣланъ посѣвъ, тѣмъ гуще образуется и дернъ, тѣмъ надежнѣе будутъ и урожаи травы. Смѣси травяныхъ сѣмянъ употребляются отъ $1\frac{1}{2}$ до 2-хъ пудовъ на десятину. Кому покупка сѣмянъ не по карману, тотъ можетъ вмѣсто ихъ употреблять сѣнную труху, только труху непремѣнно отъ хорошаго луговаго сѣна, которое по тому должно и складываться и храниться отдѣльно отъ посредственнаго и дурнаго. Трухи вмѣстѣ съ соромъ сѣннымъ на десятину высѣваютъ отъ 20 до 25 мѣшковъ. Труха не высѣвается по хлѣбу, а всегда одна. Труху можно высѣвать и по непаханному мѣсту, лишь бы только оно не было покрыто дерномъ.

3. *Собственно зеленыя или травяныя болота* находятся въ лощинахъ и котловинахъ, изъ которыхъ водѣ выхода нѣтъ; на нихъ растутъ грубыя, несъѣдаемыя травы, какъ то: тростникъ, палочникъ, пухоносъ, сошникъ и тому подобныя. Эти травы не скашиваются (*), а валятся на мѣстѣ и согниваютъ помаленьку; въ слѣдующій годъ на нихъ выростаютъ такія же травы и это продолжается до тѣхъ поръ, пока болото не высохнетъ. По осушеніи, эти болота даютъ почву ноздреватую, состоящую изъ не совсѣмъ перегнившихъ травъ. Эта почва не можетъ родить хорошихъ травъ, а потому поверхность ея выжигаютъ. Выжиганіе производится осенью, когда поверхность болота просохнетъ и травы завянутъ. Для этого при легкомъ вѣтеркѣ зажигаютъ траву по вѣтру въ нѣсколькихъ мѣстахъ, горящими пуками соломы или хвороста, но этотъ способъ не удовлетворителенъ и требуетъ повторенія года черезъ полтора или два, по тому что огонь быстро пробѣгаетъ по болотной поросли, мало касается самой поверхности болота и по тому не можетъ истребить корней сорныхъ травъ. Лучше поступать такимъ образомъ: осенью скосить траву, взмотыжить поверхность болота и уже лѣтомъ слѣдующаго года, когда взмотыженная почва просохнетъ, выжигать ее. При этомъ раздѣляютъ болото на полосы, выбираютъ день съ легкимъ вѣтеркомъ, зажигаютъ землю по вѣтру въ нѣсколькихъ мѣстахъ, наблюдаютъ, чтобы огонь, гонимый вѣтромъ, распространялся по всей полосѣ и чтобы ни одного мѣста не осталось не выженнымъ. Когда разгорится земля, то разбрасываютъ ее горящую во всѣ стороны. Такъ по очереди поступаютъ на каждой полосѣ. Огонь истребитъ не только сорныя травы, но и сѣмена

(*) Не мѣшало бы косить эти травы, хотя по льду, на подстилку въ хлѣвахъ, на что соломы у насъ почти нигдѣ не достаетъ, а отъ того происходитъ нечистота въ хлѣвахъ и убыль въ навозѣ.

и корни ихъ. Послѣ этого осенью слѣдуетъ по выжженному мѣсту высѣять достаточное количество сѣнной трухи; на слѣдующее лѣто покажутся всходы хорошихъ сладкихъ травъ, а въ послѣдствіи образуется и хорошій лугъ; нужно только время отъ времени удобрять этотъ лугъ известью или золою.

4. *Топкія мѣста* имѣютъ почву жидкую, мѣстами круглыя пятна или длинныя косы жидкой грязи и лужи воды; дернъ на нихъ слабый и рѣдкій, а на грязи и лужахъ не растетъ и трава. Осушать ихъ весьма трудно, а обращать въ луга возможно только тогда, когда они совсѣмъ высохнутъ и осядутъ. Тогда поднимаютъ землю съ осени, а весною, когда колья распадутся, посыпаютъ ее золою или сженною известью. Потомъ сѣютъ овесъ, а по немъ тимоѳеевку; если же нѣтъ сѣмянъ ни тимоѳеевки, ни другихъ кормовыхъ травъ, то высѣваютъ прямо одну сѣнную труху. Отъ всходовъ скоро образуется крѣпкій дернъ, а потомъ и хорошій лугъ.

5. *Болота моховыя и торфяныя*, подъ верхнимъ слоемъ мха, имѣютъ рыхлую темноватаго цвѣта землю, состоящую изъ мховъ и травъ, не совсѣмъ сгнившихъ. Эта земля называется торфомъ. Чтобы превратить эти болота, послѣ осушки ихъ въ луга, для этого употребляются разные способы, смотря по тому вынутъ изъ болота торфъ или нѣтъ. А торфъ вынимается для различныхъ потребностей. Иногда онъ вынимается на топливо, потому что имъ можно топить печки, точно также, какъ и дровами: онъ горитъ и жара много даетъ; въ этомъ случаѣ вырѣзываютъ его правильными кирпичами. Берутъ торфъ еще на подстилку въ хлѣвахъ и скотныхъ дворахъ, а также на удобреніе глинистыхъ почвъ и на составленіе компостовъ; въ этихъ случаяхъ его просто копаютъ, а не вырѣзываютъ кирпичами. Во всякомъ случаѣ торфъ не вынимается весь сплошь до дна, а всегда оставляютъ на днѣ болота слой торфа вершковъ въ пять толщиною. Если торфъ вынутъ, то на оставшійся на днѣ болота слой его настилаютъ нѣсколько обыкновенной земли изъ канавъ, или изъ другаго мѣста, выравниваютъ болото, вывозятъ на него навозъ, или известь, и пашутъ нѣсколько разъ, чтобы хорошенько перемѣшать между собою торфъ землю и удобреніе. Послѣ того засѣваютъ это мѣсто хлѣбомъ и по хлѣбу сѣменами кормовыхъ травъ. Такимъ образомъ на мѣстѣ вынутаго торфа вскорѣ образуется хорошій лугъ. Если нѣтъ сѣмянъ кормовыхъ травъ, да недостаетъ и удобренія, то разравниваютъ поверхность болота, пашутъ землю и высѣваютъ сѣнную труху. Отъ сѣнной трухи и при томъ безъ удобренія не можетъ образоваться такой хорошій лугъ, какъ отъ чистыхъ сѣмянъ по удобренію, но и посѣвъ сѣнной трухи въ этомъ случаѣ все же лучше, чѣмъ заростаніе несѣянной травой, отъ того

что отъ трухи скорѣе образуется лугъ и онъ скорѣе будетъ давать урожаи.

Можно и безъ выемки торфа на моховыхъ и торфяныхъ болотахъ завести луга и это дѣлается различными способами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ близъ Петербурга съ осушеннаго болота сдираютъ верхній слой мха и выравниваютъ поверхность болота; зимой на это мѣсто вывозятъ столько глины, чтобъ она могла покрыть его почти на вершокъ толщиною. Когда глину разровняютъ, тогда удобряютъ ее золотомъ изъ отхожихъ мѣстъ, пашутъ, боронуютъ, сѣютъ здѣсь овесъ и по немъ тимофеевку. По этому способу скоро можно изъ болота сдѣлать прекрасный лугъ; только этотъ способъ дорогъ, потому что одной глины понадобится вывести болѣе 1000 возовъ на десятину. Въ другихъ мѣстахъ, также близъ Петербурга, осушенное болото боронуютъ нѣсколько разъ тяжелыми желѣзными боронами, чтобы содрать мохъ и ягодные кустарники. Содранное сожигаютъ и золу разбрасываютъ по болоту, а по первозимью удобряютъ это мѣсто золотомъ, полагая по 60 бочекъ на десятину. Весною, когда земля до того высохнетъ, что рабочій скотъ безъ вреда для нея можетъ ходить по ней, забораниваютъ золото: послѣ того сѣютъ овесъ, снова боронуютъ и, наконецъ, высѣваютъ тимофеевку. Третій способъ представляетъ выжиганіе торфа, которое производится также, какъ сказано было выше о выжиганіи земли. Выжженное мѣсто засѣвается хлѣбомъ; по снятіи хлѣба оно снова выжигается и снова засѣвается хлѣбомъ. По выжженному торфу наиболѣе сѣется рожь и гречиха. Такое выжиганіе торфа и сѣяніе потомъ хлѣба продолжается до тѣхъ поръ, пока на днѣ болота останется слой торфа не толще полуаршина. Тогда по хлѣбу высѣваются кормовыя травы и образуется лугъ.

Осушеніе болотъ и образованіе изъ нихъ луговъ—дѣло трудное, не всякому крестьянину доступное, особливо если выпадетъ болото большое и при томъ топкое или моховое. Но чего не сдѣлать одному, то легко дѣлается артелью. Если цѣлое общество согласится осушить какое нибудь болото и обратить его въ лугъ, то въ успѣхѣ нельзя сомнѣваться. Тутъ одни могутъ участвовать натурой, т. е. могутъ работать на болотѣ, другія могутъ участвовать вносомъ денегъ, для которыхъ при большихъ работахъ всегда найдется мѣсто. Такое дѣло, предпринятое съ общаго согласія, совершаемое подъ наблюденіемъ людей опытныхъ и добросовѣстныхъ и исполняемое людьми, сознающими его пользу для всего общества, должно имѣть успѣхъ. Примѣры это доказываютъ. Когда одинъ или нѣсколько крестьянъ захотятъ осушить и обратить въ лугъ извѣстное болото, тогда общество, если само не хочетъ браться за это дѣло, не только не должно препятствовать желающимъ,

но еще за труды и издержки должно доставить имъ право пользованія осушенною землею въ продолженіи 10 или 15 лѣтъ. По прошествіи этого времени, такіе луга поступаютъ въ число общественныхъ земель.

О РАЗВЕДЕНІИ ТОРИЦЫ.

Торица или *шпергель* (Spergula arvensis) принадлежитъ къ однолѣтнимъ весьма питательнымъ кормовымъ растеніямъ. Въ особенности при недостаткѣ хорошаго выгона, очень полезно кормить молочный скотъ зеленою торицею, когда лѣтомъ пригоняютъ его домой, въ полдень и на ночь. Коровы весьма охотно ѣдятъ эту траву, отъ которой у нихъ замѣтно увеличивается удой.

Торица удается всего лучше на легкой песчаной, или суглинистой почвѣ, если только она не слишкомъ суха, на плотной же глинистой почвѣ она родится худо.

Такъ какъ торица ростетъ скоро и къ косьбѣ на кормъ поспѣваетъ примѣрно чрезъ 8 недѣль послѣ посѣва, то ее удобно сѣять въ паровомъ полѣ, потому что послѣ уборки торицы, если она была посѣяна рано, останется еще довольно времени для удобренія подъ озимь. Для этого надобно вспахать съ осени и заборонить землю, весною же, когда земля нѣсколько просохнетъ, слѣдуетъ опять перепахать землю, а потомъ, по вспаханному, сѣять торицу, заборонить ее легкою бороною и укатать. При посѣвѣ торицы надобно стараться не пропустить того времени, когда земля еще сыровата, потому что на сухой землѣ торица худо всходитъ. Если торица посѣяна въ паровомъ полѣ, то надобно скосить ее всю вдругъ и высушить на сѣно. Но для того, чтобы имѣть свѣжую траву, въ теченіе всего лѣта до поздней осени, посѣвъ ея надобно производить въ разное время. Для этого отдѣляютъ участокъ земли въ яровомъ полѣ, или запольный, лежащій безъ употребленія. Такой участокъ, примѣрно въ одну десятину, надобно раздѣлить на 6 полосъ: первую полосу засѣять торицею весною, когда земля просохнетъ,—вторую чрезъ двѣ недѣли послѣ первой,—третью чрезъ двѣ недѣли послѣ второй, и такъ далѣе, пока не будетъ засѣянъ весь участокъ. Если первая полоса была засѣяна за недѣлю до Николина дня (9 мая), то торица поспѣетъ къ косьбѣ около Петрова дня (29 іюня). На этой полосѣ надобно ежедневно скашивать столько травы, чтобы ее хватило до того времени, когда поспѣетъ на второй полосѣ, т. е. примѣрно на двѣ недѣли. По этому распредѣленію, послѣднюю полосу придется засѣять спустя недѣлю послѣ Петрова дня и торица на ней поспѣетъ къ косьбѣ около 8 сентября; слѣдовательно, можно кормить коровъ свѣжею травою

отъ Петрова дня почти до Покрова, т. е. примѣрно 80 дней, а такъ какъ съ одной десятины можно накосить торицы до 400 пудовъ и даже болѣе, то на каждый день придется около 5 пудовъ травы.

Въ небольшихъ хозяйствахъ, страдающихъ отъ недостатка выгоновъ, такой разновременный посѣвъ торицы очень полезенъ. Для этого надобно вспахать и заборонить съ осени первыя двѣ полосы; въ день посѣва перепахать ихъ, посѣять торицу подъ борону и укатать землю легкимъ каткомъ. Остальныя полосы, на которыхъ предположено сѣять позже, съ осени не нужно пахать, а достаточно каждую полосу пахать за 3 недѣли, а боронить за двѣ недѣли до посѣва.

На казенную десятину плодородной земли достаточно 1 пуда сѣмянъ торицы; но ежели земля худа и при томъ суха, то должно сѣять гуще, до полутора и даже до 2-хъ пудовъ сѣмянъ; сѣять ее должно въ то время, когда земля еще сыровата или когда предвидится въ скоромъ времени дождь. Если же спустя 8 или 10 дней послѣ посѣва, торица не взойдетъ, то необходимо поле слегка проборонить и вновь обсѣять.

Для разведенія сѣмянъ торицы, не требуется много земли, потому что она очень урожайна. Съ участка, длиною въ 20, шириною въ 10 сажень, можно легко собрать столько сѣмянъ, сколько нужно для посѣва на цѣлую десятину и даже болѣе.

О РАЗВЕДЕНІИ ТИМОФЕЕВОЙ ТРАВЫ.

Тимофеева трава, тимофеевка, луговой оржанецъ или *палочникъ* (Phleum pratense) принадлежитъ къ растеніямъ многолѣтнимъ и, разъ посѣянная, можетъ давать хорошіе укосы въ теченіи отъ 4 до 10 и болѣе лѣтъ. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тимофеевка сохраняется въ чистомъ видѣ не болѣе 3 лѣтъ; на 4 годъ между нею начинаютъ показываться постороннія травы, а на пятомъ году сборъ сѣна бываетъ уже скуденъ, если не унавозить поле поверхъ земли.

Относительно почвы и погоды, тимофеева трава гораздо менѣе взыскательна, нежели красный клеверъ. Для успѣшнаго ея роста, земля можетъ быть даже сырѣе, чѣмъ для клевера. Тимофеевка ростетъ отлично и на такой мокрой землѣ, гдѣ клеверъ пропалъ бы отъ вымочки, но лучше всего эта трава удается на супескахъ, нѣсколько влажныхъ, даже на осушенныхъ болотахъ, не подверженныхъ застою воды.

Послѣ уборки краснаго клевера, если только онъ былъ хорошаго и густаго роста, земля остается рыхлою и чистою отъ сорныхъ травъ,

такъ что для посѣва хлѣба большею частію бываетъ достаточно вспахать клеверное жниво только одинъ разъ; но послѣ тимофеевки земля сильно задернѣваетъ, такъ что для послѣдующаго посѣва необходимо обработать ее самымъ старательнымъ образомъ.

Тимофеевка обыкновенно сѣется по яровому хлѣбу, чрезъ 3 или 4 дня послѣ его посѣва, именно когда покажутся всходы, посѣвъ травы тотчасъ укатываютъ. Но какъ тимофеевка долѣе даетъ укосъ, то ее выгоднѣе сѣять на такихъ участкахъ, которые назначаются подъ луга. По снятіи хлѣба, засѣянныя тимофеевкою мѣста превращаются въ богатые покосы особенно когда земля плодородна, какъ это обыкновенно бываетъ на подсѣкахъ, и притомъ сыра; чѣмъ она сырѣе, тѣмъ лучше родится трава, а на сухой песчаной землѣ она растетъ дурно.

На десятину высѣваютъ отъ 30 до 40 фунтовъ сѣмянъ тимофеевки; но если траву сѣютъ одну не по хлѣбу, то посѣвъ дѣлаютъ гуще или высѣваютъ смѣсь изъ 20 фунтовъ тимофеевки, 12 фунтовъ бѣлаго клевера и 8 краснаго.

Косить тимофеевку надобно въ то время, какъ только она начнетъ колоситься; когда она уже выколосится, то сѣно бываетъ соломисто и жестко; можно косить и два раза въ лѣто. Съ одной десятины въ два укоса собираютъ отъ 150 до 200 пудовъ сѣна.

Тимофеевка сушится на сѣно точно такъ, какъ обыкновенная луговая трава, а не такъ, какъ клеверъ.

Сборъ сѣмянъ, въ особенности ихъ очищеніе, гораздо легче, чѣмъ клевера, хотя и производится тѣмъ же порядкомъ. Зрѣлость сѣмянъ узнается по желтизнѣ колосьевъ.

ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ОГУРЕЧНЫХЪ ПЛЕТЕЙ.

Огуречныя плети, остающіяся на грядахъ по уборкѣ огурцовъ, у насъ не имѣютъ никакого употребленія: осенью или весной они сбираются съ грядъ граблями и выбрасываются изъ огорода, какъ негодный соръ. Между тѣмъ, если дать этимъ плетямъ пролежать зиму подъ снѣгомъ, весной собрать, перемыть и перетерѣть хорошенько въ чистой водѣ, то изъ нихъ получается мягкое и довольно упругое мочало, уступающее липовому мочалу только въ крѣпости. Огуречное мочало можно употреблять въ банѣ, также при обмываніи столовой и другой посуды и для набивки тюфяковъ.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Іюня 8 дня 1861 года. Ценсоръ *Веселаго*.

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.