СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 19. 1861.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 НИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: О РАЗВЕДЕНІИ ШЕЛКОВИЦЫ. — О ВЫРАЩИВАНІИ СѢМЯНЪ БѢЛОЙ КОЧАННОЙ КАПУСТЫ. — О ВОСПИТАНІИ ЯГНЯТЪ. — О ВЫРАЩИВАНІИ ЦВѢТНОЙ КАПУСТЫ.

О РАЗВЕДЕНІИ ШЕЛКОВИЦЫ.

Шелководство составляетъ, какъ извѣстно, промыселъ, весьма выгодный, въ благопріятныхъ для этой отрасли сельскаго хозяйства мѣстностяхъ. Не требуя большихъ трудовъ и занимая земледѣльца не болѣе шести недѣль въ году, оно можетъ доставлять ему довольно значительный доходъ. Кромѣ того, оно не отнимаетъ у хозяйства мужскихъ работниковъ, нужныхъ для болѣе трудныхъ работъ; вмѣсто нихъ, уходъ за червями могутъ имѣть женщины и дѣти, которымъ придется употребить на это занятіе только по нѣскольку часовъ въ день, такъ какъ червей можно кормить лишь три или четыре раза въ сутки; остальное же время можетъ быть употреблено на другія работы.

Но для занятія шелководствомъ необходимы тутовыя деревья или шелковица, листья которой служатъ единственною общепринятою пищею обыкновеннаго шелковичнаго червя. Дерево это имѣетъ, сверхъ того, еще и многія другія полезныя свойства. Оно очень скоро растетъ и на хорошей землѣ даетъ въ годъ вѣтви и побѣги въ сажень; по этому, оно можетъ быть даже въ сухихъ мѣстахъ успѣшно употребляемо на жилыя изгороди. Вообще, гдѣ оно укоренится, тамъ его почти нельзя истребить, потому что корни его пускаютъ постоянно новые побѣги. Дерево шелковицы отличается большою крѣпостію и годится на изготовленіе осей для телѣгъ и другихъ подѣлокъ. Ягоды ея сладки и могутъ быть употребляемы въ пищу сырыя; кромѣ того, изъ нихъ можно приготовлять вино, имѣющее сходство съ вишневымъ, а также и хорошій уксусъ.

Шелковицы существуетъ нѣсколько видовъ. Обыкновеннѣйшій изъ нихъ—это *бѣлая шелковица*, получившая свое названіе отъ цвѣта листьевъ, которые свѣтлѣе, чѣмъ у другихъ породъ; ягоды же ея бываютъ бѣлыя, красныя и черныя, съ различными оттѣнками. Изъ прививныхъ

болѣе извѣстны: 1) *бѣлая персидская*, у которой ягоды безъ зеренъ, а листья крупные, лоснящіеся,—эта порода боится морозовъ, и 2) *черная крупная* съ темными, жесткими листьями и крупными ягодами, величиною съ мелкую сливу; она можетъ рости только въ самыхъ южныхъ мѣстностяхъ. Обѣ прививаются къ обыкновенной шелковицѣ.

Изъ всѣхъ способовъ разведенія шелковицы самый надежнѣйшій и лучшій есть выращиваніе изъ сѣмянъ, потому что только съ помощію его можно надѣяться получить самыя сильныя и красивыя растенія. Прежде всего, разумѣется, слѣдуетъ стараться добыть доброкачественныхъ, не утратившихъ еще способности прозябанія сѣмянъ. Собираніе ихъ производится слѣдующимъ образомъ.

Когда ягоды совершенно поспѣютъ, что бываетъ обыкновенно въ іюнѣ мѣсяцѣ, ихъ стряхиваютъ съ дерева на разостланный подъ нимъ холстъ. Для этого выбираютъ не слишкомъ молодыя и не слишкомъ старыя деревья, съ которыхъ не снимали въ тотъ годъ листьевъ для кормленія червей. Самое собираніе ягодъ не должно откладывать слишкомъ долго, потому что разныя птицы, которымъ онѣ служатъ пищею, скоро съѣдаютъ ихъ, а такъ какъ ягоды поспѣваютъ разомъ, то собирать ихъ должно въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Отобравъ изъ нихъ самыя зрѣлыя, ихъ складываютъ въ сосудъ съ водою и раздавливаютъ руками. Какъ скоро зерна отдѣлились отъ мяса плодовъ и опустились на дно сосуда, воду сливаютъ осторожно и наливаютъ, вмѣсто нея, свѣжей, повторяя это до тѣхъ поръ, пока зерна не будутъ совершенно чисты. За тѣмъ ихъ высыпаютъ на кусокъ холстины и относятъ въ прохладное, тѣнистое мѣсто, чтобы дать имъ медленно просохнуть. Высохшія сѣмена растираютъ потомъ руками, для того чтобы отдѣлить отъ нихъ послѣднія посторонныя частицы и провѣиваютъ. Доброкачественныя сѣмена можно узнать потому, что они скоро тонутъ въ водѣ, а если ихъ раздавить, то изъ нихъ выступаетъ масло. Одинъ золотникъ шелковичныхъ сѣмянъ содержитъ въ себѣ до двухъ съ половиною тысячъ зеренъ; слѣдовательно, въ фунтѣ ихъ болѣе двухъ сотъ тысячъ.

Для посѣва слѣдуетъ выбирать защищенное отъ сѣверныхъ вѣтровъ мѣсто, лучше всего расположенное на юго-востокъ, съ хорошею черноземною, нѣсколько песчаною почвою. Такое мѣсто слѣдуетъ вскопать поглубже съ осени и удобрить перепрѣлымъ хлѣвнымъ навозомъ. Еще пригоднѣе для этой цѣли жидкое удобреніе изъ отхожихъ мѣстъ. Сѣмя высѣваютъ обыкновенно на слѣдующій годъ рано весною, какъ скоро прекратятся морозы, слѣдовательно, въ апрѣлѣ или въ началѣ мая. Передъ посѣвомъ хорошо вымочить сѣмена въ продолженіе сутокъ въ пахтаньѣ, остающемся послѣ сбиванія масла, или въ дождевой водѣ, которая подвергалась въ продолженіе нѣсколькихъ дней дѣйствію солнца и воздуха; къ водѣ можно также прибавить на сто ея фунтовъ два фунта соляной кислоты, которая способствуетъ скорѣйшему проростанію зеренъ впослѣдствіи. По прошествіи сутокъ, сѣмена вынимаютъ, даютъ имъ обсох-

нуть и высѣваютъ потомъ на хорошо разрыхленную и обработанную почву густыми рядами, отстоящими одинъ отъ другаго на девять дюймовъ. Это самый лучшій способъ посѣва, потому что онъ даетъ возможность очищать впослѣдствіи всходы отъ сорныхъ растеній. Высѣянныя такимъ образомъ сѣмена засыпаютъ потомъ слоемъ земли, толщиною въ одинъ дюймъ, и поливаютъ лейкою или черезъ вѣникъ, повторяя эту поливку не только до появленія всходовъ, но и впослѣдствіи, въ продолженіе всего лѣта, черезъ день по вечерамъ. Въ тоже время слѣдуетъ постоянно заботиться объ очищеніи всходовъ отъ сорныхъ травъ, которыя безъ выпалыванія легко могутъ заглушить взошедшіе сѣянцы. Этими двумя работами и ограничивается весь уходъ за ними въ первое лѣто, послѣ посѣва.

Во второе лѣто, когда растенія уже достаточно вошли въ силу, ихъ пересаживаютъ на хорошо вскопанное и выровненное мѣсто рядами, отстоящими одинъ отъ другаго на двѣнадцать до шестнадцати дюймовъ, такъ чтобы разстояніе между самими сѣянцами въ рядахъ составляло отъ двухъ до трехъ дюймовъ. При пересадкѣ, должно заботиться въ особенности о томъ, чтобы земля была хорошо придавлена къ корнямъ и чтобы они были совершенно покрыты ею. И въ это второе лѣто слѣдуетъ молодыя деревца поливать черезъ день или черезъ два, смотря по состоянію погоды, и очищать почву отъ сорныхъ растеній.

Если же въ началѣ втораго года растенія еще не довольно сильны для пересадки, то ихъ оставляютъ на томъ же мѣстѣ еще на годъ и только заботятся о ихъ поливкѣ и о пропалываніи сорныхъ травъ. Эти выращенныя изъ сѣмянъ деревца называются дичками. Они покрыты обыкновенно болѣе или менѣе разрѣзанными на лопасти листьями, которые иногда очень малы, какъ у терновника. Между ними встрѣчаются, однакоже, всегда растенія съ цѣльными листиками; такія деревца слѣдуетъ пересадить отдѣльно, потому что изъ нихъ выходятъ впослѣдствіи самыя сильныя и здоровыя растенія. Опытный глазъ можетъ отличить ихъ, однакоже, не раньше, какъ въ третьемъ году. Остальныя должны быть привиты, если хотятъ, чтобы изъ нихъ образовались хорошія деревья; если же ихъ предполагается употреблять для живыхъ изгородей, то въ такомъ случаѣ можно обойтись и безъ прививки.

Дальнѣйшій уходъ за шелковичными насажденіями долженъ состоять въ подрѣзываніи весною сухихъ нижнихъ вѣтвей, для того, чтобы деревья росли прямо и не образовали кустовъ, въ очищеніи отъ червей и содержаніи въ чистотѣ отъ сорныхъ растеній.

Сѣянцы, предназначенные для живыхъ изгородей, должно, напротивъ, срѣзать на другую весну у самаго корня, а въ третью на четверть аршина отъ земли и впослѣдствіи отъ времени до времени подстригать ихъ, для того, чтобы они больше развѣтвлялись и росли кустарникомъ.

Для прививки дичковъ всего лучше употреблять бѣлую персидскую шелковицу, отъ которой они получаютъ болѣе крупные листья и ягоды.

Самая прививка производится такимъ же образомъ, какъ и прививаніе плодовыхъ деревьевъ. За неимѣніемъ по близости бѣлой персидской шелковицы, можно, впрочемъ, брать для прививки черенки и съ не привитыхъ шелковицъ, выбирая для этого деревья съ крупными цѣльными листьями, растущія не на очень низкомъ и сыромъ мѣстѣ.

О выращиваніи сѣмянъ бѣлой кочанной капусты.

Для полученія сѣмянъ бѣлой кочанной капусты слѣдуетъ осенью, когда капуста уже завилась въ кочни и наступили заморозки, выдернуть изъ земли осторожно съ корнями лучшіе по крѣпости, величинѣ и бѣлизнѣ кочни и обрѣзать всѣ кривые корни, потому что при пересадкѣ они не станутъ болѣе рости и, слѣдовательно, не приносятъ никакой пользы. Затѣмъ слѣдуетъ обломать у кочней всѣ не плотно прилегающіе листья, выкопать яму отъ трехъ до четырехъ футовъ глубины (длина и ширина ямы должны зависѣть отъ числа кочней, которые предполагается сохранять), выстлать ее слоемъ длинной ржаной или овсяной соломы и, положивъ на него кочни въ одинъ рядъ, прикрывать его также слоемъ соломы. Потомъ яму снова засыпаютъ и дѣлаютъ, сверхъ того, надъ нею возвышеніе изъ земли, которую уколачиваютъ какъ можно плотнѣе, для того, чтобы внутрь не могла проникать сырость. Опытъ показалъ, что изъ всѣхъ способовъ сохраненія на зиму кочанной капусты, брюквы и моркови, описанный здѣсь есть самый лучшій.

Съ наступленіемъ весенней теплой погоды капустные кочни должно вынуть изъ ямы и, выбравъ хорошо приготовленную гряду, посадить ихъ другъ отъ друга на разстояніи по крайней мѣрѣ одного фута, такъ, однакоже, чтобы между кочнемъ и землею оставалось мѣсто съ палецъ толщиною. Если кочни не развернулись сами собою въ ямѣ, то на верхушкѣ ихъ должно сдѣлать по срединѣ крестообразный разрѣзъ, приблизительно на полъ-дюйма глубины, для того, чтобы стволъ могъ легче вырости изъ этого отверстія наружу. Когда изъ кочней выйдутъ цвѣтные стволы, то слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, какъ постепенно увядаютъ или загниваютъ наружные листья кочня. Такіе листья должно немедленно обрывать, для того, чтобы отъ накопленія въ нихъ сырости или дождевой воды не загнилъ и главный стволъ. Когда цвѣтные стебли достигнутъ нѣкоторой вышины, то у каждаго изъ нихъ нужно вбить въ землю по шесту и подвязать къ нему мочалкою стебель, однакоже, не слишкомъ крѣпко. Какъ скоро побѣжныя вѣтви начнутъ разростаться, то должно протянуть между ними и вокругъ нихъ нитки, такъ чтобы онѣ могли свободно рости, но не ломались отъ вѣтра. Плодотворная пыль переносится съ однихъ цвѣтковъ на другіе вѣтромъ, но въ тихую погоду, когда капустные стебли будутъ въ полномъ цвѣту, ихъ должно пошевеливать руками для облегченія оплодотворенія. Если во время вызрѣванія сѣмянъ наступятъ морозы, то сѣменныя гряды должно прикрывать рогожками. Для этого наколачиваютъ по всей грядѣ въ четыре ряда колья, на разстояніи сажени одинъ

отъ другаго. Эти колья должны быть выше сѣмянныхъ стеблей. Къ верхнимъ концамъ ихъ привязываются потомъ продольныя жерди, на которыя и накладываются къ ночи, въ случаѣ надобности, рогожи въ одинъ рядъ.

Когда стручья пожелтѣютъ, тогда должно срѣзать стебли у самыхъ стволовъ и разложить на доскѣ подъ навѣсомъ, обращеннымъ на полдень, а въ ясную погоду выносить на солнце и оставлять ихъ до тѣхъ поръ, пока стручья и зерна не высохнутъ совершенно. Полученныя такимъ образомъ сѣмена, хотя и не красивы на видъ, однакоже, всходятъ и ростутъ потомъ хорошо. Если же дать сѣменамъ совсѣмъ дозрѣть на стебляхъ въ огородѣ, то созрѣваніе ихъ будетъ не равномѣрное. Много сѣмянъ выпадетъ изъ полопавшихся стручьевъ или будетъ съѣдено птицами, а часть останется все-таки недозрѣвшими.

При посѣвѣ этихъ сѣмянъ должно поступать слѣдующимъ образомъ: почву слѣдуетъ слегка удобрить куринымъ пометомъ, потому что это ускоряетъ ростъ всходовъ, нисколько не вредя имъ, потомъ хорошенько вскопать и разрыхлить граблями. Сѣмя высѣвается на приготовленныя такимъ образомъ гряды не слишкомъ густо и земля утаптывается небольшою досчечкою, привязанною къ ногѣ. Это утаптываніе сѣмянъ оказывается вообще очень полезнымъ для всѣхъ сортовъ капусты и брюквы, равно какъ и для лука. Многолѣтній опытъ показалъ, что оно сохраняетъ почвѣ плодородіе даже въ засуху, ускоряетъ ростъ растеній и дѣлаетъ ихъ на хорошей, не сырой почвѣ безопасными отъ нападенія земляныхъ блохъ.

О воспитаніи ягнятъ.

Пища новорожденныхъ ягнятъ, въ первыя четыре недѣли, должна состоять только изъ одного материнскаго молока. Въ послѣдствіи они сами начинаютъ подбѣгать къ яслямъ и пробовать кормъ, задаваемый маткамъ. Въ эту пору слѣдуетъ отгородить для нихъ въ хлѣвѣ особое мѣсто съ небольшими яслями съ рѣшеткою, въ которыя подкладывается для нихъ, въ то время, когда кормятъ матокъ, хорошее сладкое сѣно или совершенно сухой клеверъ. Входъ въ эту загородку долженъ быть устроенъ такъ, чтобы черезъ него могли проходить только ягнята. Такимъ образомъ ягнята пріучаются уже въ хлѣвѣ къ новой пищѣ и выгоняются потомъ весною съ наступленіемъ теплой погоды, вмѣстѣ съ матками, на пастбище. До тѣхъ поръ, пока они, по вечерамъ, еще возвращаются домой, имъ можно давать также небольшое количество зеренъ въ особенности овса, потому что они отъ этого лучше ростутъ. Въ іюлѣ или августѣ ягнятъ, ходившихъ до того времени на пастбищѣ вмѣстѣ съ матками, отдѣляютъ отъ нихъ совершенно. Если пастбище здорово и хорошо, то они скоро забываютъ матокъ, наѣдаются до-сыта зеленымъ кормомъ и видимо успѣваютъ въ ростѣ. Лучшія пастбища для ягнятъ тѣ, которыя расположены на высокихъ и сухихъ мѣстахъ

и на которыхъ ростутъ хотя мелкія, но вкусныя травы, какъ-то: трилистники, ледвецы, тминъ, тысячелистникъ и другія. Впрочемъ, кромѣ пищи, оказываетъ на ягнятъ большое вліяніе также и состояніе погоды. Если въ жаркіе лѣтніе дни въ полуденный жаръ, въ сильныя грозы, при частыхъ дождяхъ и въ холодныя ночи ихъ можно укрывать въ хлѣвахъ, то это предохранитъ ихъ отъ многихъ болѣзней и послужитъ къ большой для нихъ пользѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ягнятъ, однакоже, на пастбища не выпускаютъ; въ такомъ случаѣ и кормленіе ихъ должно быть другое. Если они лѣтомъ получаютъ зеленый кормъ, то при этомъ необходимо имѣть еще въ запасѣ и сухой кормъ, который дается имъ въ сырую и плохую погоду. Хотя мокрая трава или клеверъ для нихъ не такъ опасны, какъ мокрое пастбище, однакоже, въ большомъ количествѣ такой кормъ можетъ имѣть вредное вліяніе на ихъ здоровье. Чтобы предотвратить эти вредныя послѣдствія, имъ слѣдуетъ давать передъ тѣмъ сухую кормовую солому, для чего особенно пригодны ячменная и овсяная солома. Кромѣ того ягнята, содержимые въ хлѣвахъ, должны получать чистую хорошую воду, въ которой можно разбалтывать нѣкоторое количество дробленыхъ зеренъ или отрубей. Должно также заботиться о доставленіи имъ необходимаго движенія; по этому по временамъ ихъ слѣдуетъ выпускать изъ хлѣвовъ на отгороженный дворъ.

По достиженіи баранками трехъ или четырехъ-недѣльнаго возраста, тѣхъ изъ нихъ, которые не предназначаются на племя, слѣдуетъ выхолостить. Чѣмъ они моложе, тѣмъ лучше выдерживаютъ холощеніе. Тѣмъ же изъ ярокъ, которыя предназначаются для приплода, слѣдуетъ подрѣзать хвосты. Это дѣлается потому, что хвостъ матки слишкомъ марается мочею и во время кормленія ягнятъ загрязняетъ и вымя.

Ягнята не рѣдко страдаютъ отъ поноса, который бываетъ иногда причиною сильной смертности между ними. Если причина болѣзни заключается въ самихъ животныхъ, то нужно позаботиться о тепломъ хлѣвѣ и здоровой пищѣ и давать имъ пить отваръ изъ ромашки. Когда же болѣзнь произошла отъ матокъ, то нужно улучшить ихъ кормъ, для того, чтобы молоко ихъ сдѣлалось здоровѣе, а если послѣднее слишкомъ жирно, то перевести ихъ на менѣе питательный, но здоровый и хорошій кормъ. Молодымъ ягнятамъ можно при этомъ давать выше упомянутый отваръ ромашки. Нѣкоторые совѣтуютъ также перевязывать какъ можно крѣпче шерстяною ниткою хвостъ у самаго корня и увѣряютъ, что средство это оказывается всегда дѣйствительнымъ. Дѣйствіе этого страннаго средства основывается, безъ сомнѣнія, на томъ, что ягненокъ ощущаетъ, вслѣдствіе перевязки хвоста, боль, а потому въ продолженіе нѣкотораго времени рѣже сосетъ матку, что и способствуетъ прекращенію поноса.

Мѣсячные или двухмѣсячные ягнята еще чаще поражаются другою губительною болѣзнію, отъ которой многіе изъ нихъ умираютъ. Она обнаруживается одеревянѣлостью и неподвижностію суставовъ и членовъ, судорожнымъ

стягиваніемъ ихъ, печальнымъ видомъ животнаго и совершеннымъ отсутствіемъ позыва къ питью; въ то же время замѣчается ускоренное біеніе сердца. О причинѣ этой болѣзни мнѣнія различны: одни утверждаютъ, что она происходитъ отъ сырыхъ, нездоровыхъ хлѣвовъ, незащищенныхъ надлежащимъ образомъ отъ рѣзкаго, сквознаго вѣтра; другіе же полагаютъ, что болѣзнь эта есть слѣдствіе корма, получаемаго матками. Какъ плохой и нездоровый, такъ и слишкомъ питательный кормъ, какъ, напримѣръ, клеверъ могутъ быть ея причиною. Всего вѣроятнѣе, что болѣзнь эта происходитъ отъ молока матокъ. Леченіе ея довольно трудно. Для предупрежденія ея слѣдуетъ отпускать маткамъ всегда здоровый, но не слишкомъ тяжелый, хотя и питательный, кормъ и иногда давать имъ слабительное. Ягнятамъ же должно при первомъ появленіи болѣзни ставить промывательное изъ отвара ромашки съ масломъ, обмывать члены теплою водою, натирать опухоли скипидарнымъ масломъ и обвертывать ноги сѣрными питками. Въ ясную, теплую погоду больныхъ ягнятъ нужно почаще выносить и класть на солнце, потому что тепло имъ очень полезно. Другое средство состоитъ въ томъ, что больныхъ животныхъ вытираютъ теплымъ хлѣбнымъ виномъ, завертываютъ въ холстъ и кладутъ въ овечій навозъ.

Годовалые ягнята нерѣдко поражаются также круженіемъ. Эта болѣзнь происходитъ отъ того, что въ мозгу ягненка зарождается пузырчатая глиста. Пораженныя ею животныя ходятъ какъ бы въ безпамятствѣ или какъ будто оглушенныя, отказываются отъ корма, не слѣдятъ за стадомъ, держатъ шею въ сторону, бѣгаютъ вокругъ, поражаются, наконецъ, судоргами и умираютъ. Старшіе ягнята носятся иногда съ этою болѣзнію нѣсколько мѣсяцевъ, сосуны, напротивъ, издыхаютъ уже по прошествіи нѣсколькихъ дней, потому что они безъ корма долго жить не могутъ. Леченіе этой болѣзни очень трудно, такъ какъ удалить изъ мозга глисту возможно только въ рѣдкихъ случаяхъ. По этому, всего лучше убивать заболѣвшее животное, пока оно еще въ тѣлѣ и пока мясо его годно въ пищу. Головы ягнятъ, страдавшихъ круженіемъ, не должно выкидывать въ такое мѣсто, гдѣ ихъ могутъ съѣсть собаки, потому что это много способствуетъ распространенію болѣзни. Для большей безопасности ихъ лучше сожигать.

О выращиваніи цвѣтной капусты.

Цвѣтная капуста принадлежитъ къ числу самыхъ вкусныхъ овощей и цѣнится по этому всегда выше другихъ кухонныхъ растеній. Но выращиваніе ея требуетъ большаго умѣнья и внимательности; по этому доходъ, получаемый отъ ея разведенія, бываетъ рѣдко удовлетворителенъ. Вотъ главнѣйшія правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться при выращиваніи этого цѣннаго овоща.

Для воспитанія хорошей цвѣтной капусты необходима прежде всего плодородная огородная земля, которая должна быть болѣе сыра, чѣмъ суха. Хорошо также, если она содержитъ нѣсколько песка, сообщающаго ей большую степень рыхлости. На вновь обработанной почвѣ

цвѣтная капуста выходитъ лучше качествомъ; по этому, ее не должно сажать къ ряду нѣсколько лѣтъ на одно и то же мѣсто, но выбирать подъ разведеніе ея каждый разъ новый участокъ.

Само собою разумѣется, что для посѣва слѣдуетъ брать только лучшія сѣмена и, за неимѣніемъ таковыхъ у себя, обращаться за ними къ извѣстнѣйшимъ продавцамъ сѣмянъ. Гдѣ позволяетъ климатъ и зимы не слишкомъ холодны, такъ можно высѣвать цвѣтную капусту въ сентябрѣ въ парники, такъ чтобы молодыя растенія могли до наступленія зимы достигнуть того роста, въ которомъ ихъ обыкновенно пересаживаютъ на грядки. При посѣвѣ, сѣмена лучше высѣвать въ парникъ порѣже. Молодыя растенія остаются во все продолженіе зимы въ парникѣ, который должно постоянно держать закрытымъ, а въ случаѣ болѣе сильныхъ холодовъ накрывать еще рогожками или толстыми соломенными циновками и обкладывать конскимъ навозомъ.

Въ мѣстностяхъ съ холоднымъ климатомъ, сѣмена цвѣтной капусты высѣваются обыкновенно въ половинѣ марта или въ началѣ апрѣля въ теплый парникъ. Позднѣе, послѣ совершеннаго прекращенія морозовъ, ихъ можно сѣять и прямо на гряды; но такой способъ выращиванія доставляетъ менѣе выгодъ, потому что цвѣтная капуста созрѣваетъ тогда слишкомъ поздно.

Предназначенныя для посадки капусты гряды должны быть вскопаны гребнями, верхушки которыхъ отстоятъ одна отъ другой на два фута; на каждую гряду придется такимъ образомъ по три возвышенія или гребня. Разсаду слѣдуетъ пересаживать изъ парниковъ въ углубленія между гребнями какъ можно раньше, разумѣется, соображаясь съ состояніемъ погоды, и сажать растенія на разстояніи двухъ до трехъ футовъ другъ отъ друга. Послѣ посадки, ихъ хорошенько поливаютъ и содержатъ въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ. Въ сухую погоду ихъ слѣдуетъ всегда поливать по вечерамъ.

Какъ скоро саженцы цвѣтной капусты достигли половины своего обыкновеннаго роста, гряды обработываютъ мотыкою для разрыхленія почвы. Когда они выросли совершенно и нужно опасаться, чтобы вѣтеръ не повалилъ ихъ, тогда уничтожаютъ борозды и выравниваютъ гряды, что вполнѣ замѣняетъ окучиваніе. Въ этомъ состояніи они остаются до тѣхъ поръ, пока капуста не поспѣетъ. Какъ скоро цвѣтъ или головка достигла половины своей величины, тогда слѣдуетъ находящіеся на стеблѣ вокругъ нея листья надломить и прикрыть ее ими, для того, чтобы предохранить ее отъ вреднаго дѣйствія солнечныхъ лучей. Безъ этой предосторожности головки будутъ зелены и грубы.

Тѣ изъ растеній, у которыхъ цвѣтъ не успѣлъ вполнѣ образоваться до наступленія осени, можно вынуть изъ грядъ и посадить въ погребъ, гдѣ они дозрѣваютъ окончательно.

При употребленіи этого способа, можно быть увѣреннымъ, что цвѣтная капуста получится отличнаго качества.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Октября 10 дня 1861 года. Ценсоръ *В. Бекетовъ.*

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.