СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 20. 1861.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ЗА 24 ЛИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: Правила, которыя слѣдуетъ наблюдать при откармливаніи животныхъ.—О кохинхинскихъ курахъ, ихъ разведеніи и выгодахъ, доставляемыхъ ими. — Объ откармливаніи гусей. — Признаки, по которымъ можно узнавать ядовитые грибы, и средства противъ отравленія ими.—Яичное масло какъ врачебное средство.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЯ СЛѢДУЕТЪ НАБЛЮДАТЬ ПРИ ОТКАРМЛИВАНІИ ЖИВОТНЫХЪ.

—

При откармливаніи какого бы то ни было рода домашнихъ животныхъ: рогатаго скота, барановъ, свиней, слѣдуетъ придерживаться нѣкоторыхъ общихъ правилъ, безъ соблюденія которыхъ нельзя надѣяться на успѣхъ дѣла. Главнѣйшія изъ этихъ правилъ состоятъ въ слѣдующемъ.

Для откармливанія на убой слѣдуетъ выбирать только способныхъ къ откармливанію животныхъ. Кто занимается откармливаніемъ въ большихъ размѣрахъ или хочетъ купить исключительно для этой цѣли одно какое нибудь животное, тотъ долженъ обращать вниманіе на многое. Во первыхъ, онъ долженъ смотрѣть на ростъ, потому что въ большей части случаевъ крупное и тяжеловѣсное животное откармливается съ большею выгодою, чѣмъ животное мелкой породы. Далѣе слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на тѣлосложеніе. Наружные признаки превосходной способности къ откармливанію составляютъ: тонкія кости; не плотно къ тѣлу прилегающая на ощупь мягкая кожа, двигающаяся легко въ ту и другую сторону; мягкая шерсть; кроткій спокойный нравъ. Только здоровыя животныя откармливаются надлежащимъ образомъ, а больныя или хворыя—для откармливанія не годятся. Наружными признаками хорошаго состоянія здоровья служатъ: ясный и веселый взглядъ, правильное біеніе сердца, большая охота къ ѣдѣ. Многіе при выборѣ для откармливанія обращаютъ вниманіе также и на цвѣтъ животнаго; такъ, напримѣръ, свѣтлобурые, желтые волы и коровы, въ особенности же пѣгіе съ бѣлымъ брюхомъ, ногами и ляшками, по словамъ опытныхъ скотоводовъ, наиболѣе пригодны для откармливанія; менѣе годятся для этой цѣли черные и сѣрые. На опытѣ дознано, что черныя свиньи тучнѣютъ медленнѣе, чѣмъ всякія другія. Не богатый хозяинъ, конечно, рѣдко въ со-

стояніи принимать въ соображеніе всѣ эти обстоятельства, потому что онъ обыкновенно откармливаетъ такой скотъ, который ему не нуженъ для работы, приплода и такъ далѣе. Но, за то, тѣмъ болѣе вниманія слѣдуетъ ему обращать на возрастъ. Слишкомъ молодыя, не достигшія еще полнаго роста, животныя требуютъ очень много корма для своего полнаго развитія, даютъ относительно менѣе жира и не столь хорошее мясо, какъ взрослыя; точно также не годятся для этой цѣли и слишкомъ старыя, потому что они, не смотря на изобильный кормъ, мало увеличиваются въ объемѣ и доставляютъ грубое и жесткое мясо. Всего пригоднѣе, слѣдовательно, для откармливанія на убой такія животныя, которыя находятся въ среднемъ возрастѣ, такъ какъ они всего лучше оплачиваютъ потраченный на нихъ кормъ. Всѣ животныя мужескаго пола, употреблявшіяся въ продолженіе долгаго времени на племя и оказавшіяся болѣе негодными для случки, должны быть передъ откармливаніемъ выхолощены. Если бы кто нибудь захотѣлъ откормить животное, страдающее легкими или печенью, то онъ не долженъ доводить откармливанія до конца; лучше убить скотину, когда она вошла достаточно въ тѣло; вообще откармливаніе такого скота сопряжено съ большими издержками и рискомъ.

Откармливаніе скота должно быть оканчиваемо въ возможно короткое время. Хозяинъ, откармливающій животное, старается, съ помощію большаго количества корма, чѣмъ сколько нужно для поддержанія жизни, увеличить количество мяса и жира и улучшить ихъ качества. Чѣмъ скорѣе будетъ эта цѣль достигнута, тѣмъ болѣе выгодъ доставитъ откармливаніе; по этому, должно стараться всѣми средствами ускорить разжирѣніе, однакоже, такъ чтобы не разстроить черезъ чуръ здоровья животнаго. Слѣдовательно, необходимо знать тѣ кормовыя вещества, которыя особенно пригодны для откармливанія. Къ нимъ принадлежатъ для большей части животныхъ зеленый кормъ, въ особенности же хорошо высушенное луговое сѣно, хлѣбныя зерна, дробленыя зерна стручковыхъ растеній — гороха, бобовъ и др., растертая въ порошокъ избоина изъ масличныхъ сѣмянъ, остающаяся по выжатіи изъ нихъ масла и, наконецъ, различные корнеплоды, какъ-то картофель, рѣпа, свекловица и другіе. Каждому извѣстно, что питательность этихъ кормовыхъ веществъ различна. Вообще самыми лучшими кормами должно считать тѣ, которые отличаются своею удобоваримостію, мягкостію и большою питательностію при маломъ объемѣ. Особенно хороши для откармливанія различные заводскіе остатки, которые иногда можно получать за безцѣнокъ. Къ такимъ остаткамъ принадлежатъ: барда, остающаяся на винокурняхъ, пивная гуща, свекловичныя выжимки съ свеклосахарныхъ заводовъ. Кромѣ того, хозяину нужно знать выгоднѣйшіе способы приготовленія кормовыхъ веществъ, которое необходимо для того, чтобы сдѣлать кормъ легко переваримымъ въ желудкѣ животнаго. Вообще чѣмъ тщательнѣе приготовленъ кормъ и чѣмъ болѣе сдѣланъ онъ удобоварительнымъ и пріятнымъ для вкуса, тѣмъ больше пользы при-

несетъ онъ при откармливаніи скота. Такое приготовленіе кормовыхъ веществъ состоитъ въ раздробленіи или раздавливаніи ихъ, въ приведеніи въ броженіе, въ квашеніи, въ развариваніи; часто достаточно даже одного размельченія, размачиванія въ водѣ или обвариванія кипяткомъ. При откармливаніи, слѣдуетъ всегда начинать съ менѣе питательнаго и вкуснаго корма и отпускать его скоту въ большомъ количествѣ. Потомъ должно постепенно переходить къ лучшему корму и уменьшать мало по малу его дачи. Хорошо также отъ времени до времени перемѣнять кормъ, потому что такая перемѣна поддерживаетъ въ животномъ охоту къ ѣдѣ. Примѣсь соли къ корму дѣлаетъ его удобоваримѣе и пріятнѣе для скота; по этому, къ каждой кормовой дачѣ должно всегда прибавлять небольшое количество соли. Большая часть скотоводовъ, прославившихся своею опытностію въ дѣлѣ откармливанія скота, совѣтуетъ задавать животнымъ кормъ небольшими дачами, но почаще. Чѣмъ чаще и чѣмъ меньшими дачами подкладываютъ передъ ними кормъ, тѣмъ сильнѣе будетъ у нихъ охота къ ѣдѣ и тѣмъ скорѣе и успѣшнѣе будетъ идти откармливаніе. Если же имъ давать за разъ большія количества корма, то они, съѣвъ только половину, станутъ пренебрегать остальнымъ и будутъ выбрасывать его въ навозъ, потому что отъ долгаго лежанія кормъ принимаетъ запахъ хлѣва и дѣлается скоту противнымъ. Всего лучше, если кормъ задается въ опредѣленные часы дня, покрайней мѣрѣ отъ девяти до десяти разъ въ сутки. Откармливаемый скотъ очень легко привыкаетъ къ времени кормленія, а если это время пропуститъ, то онъ дѣлается безпокойнымъ, что много вредитъ успѣху откармливанія; вѣсъ животнаго при такомъ неправильномъ кормленіи не только не увеличивается, но даже уменьшается.

Обварный или вареный кормъ никогда не должно давать животнымъ, пока онъ еще очень горячъ; они могутъ обжечься и тогда откармливаніе пріостанавливается на долгое время.

Для успѣха откармливанія необходима величайшая опрятность. Не только хлѣвъ, въ которомъ содержатся откармливаемыя на убой животныя, долженъ быть чистъ и опрятенъ, но и ясли и вся посуда, въ которой задаютъ имъ кормъ и пойло. Ясли и корыта всегда должно очищать отъ оставшагося въ нихъ корма и почаще ополаскивать горячею водою. Если они нечисты, то животное показываетъ отвращеніе къ корму, перестаетъ ѣсть и пить. Въ хлѣвѣ не должно быть недостатка въ хорошей подстилкѣ, которую слѣдуетъ перемѣнять какъ можно чаще, для того, чтобы въ ней не накоплялись нечистоты. Въ точно такой же опрятности должно содержать и самыхъ животныхъ, потому что тѣмъ успѣшнѣе идетъ ихъ откармливаніе. У откармливаемаго животнаго должно отложиться подъ кожею извѣстное количество жира; чѣмъ мягче и нѣжнѣе кожа, тѣмъ легче она растягивается, а это облегчаетъ отложеніе подъ нею жира. По этому, нужно какъ можно чаще вытирать животное соломою, чистить скребницею и щеткою и обмывать водою, если можно, ежедневно. Если этого не дѣлать,

то кожа покроется пылью и другими нечистотами, которыя будутъ задерживать испарину, столь необходимую для сохраненія здоровья. Эти нечистоты производятъ, кромѣ того, зудъ, вслѣдствіе чего животное не имѣетъ покоя ни днемъ, ни ночью, а спокойствіе есть одно изъ главныхъ условій успѣха откармливанія. Чистый воздухъ необходимъ для каждаго животнаго, а тѣмъ болѣе для откармливаемаго въ хлѣвѣ и не выгоняемаго на пастбище. По этому, такіе хлѣва слѣдуетъ какъ можно чаще провѣтривать для очищенія въ нихъ воздуха.

Откармливаемое животное должно имѣть какъ можно меньше излишняго движенія. Спокойствіе для успѣха откармливанія почти такъ же важно, какъ кормъ. Такъ какъ сильный жаръ, точно также какъ и холодъ, вредны для откармливанія, то необходимо заботиться о томъ, чтобы хлѣвъ былъ умѣренно тепелъ. Лѣтомъ, въ жаркое время, провѣтриваніе необходимо уже и для того, чтобы охлаждать хлѣвъ. Содержаніе въ нѣкоторой темнотѣ дѣйствуетъ благопріятно на образованіе мяса и жира у животныхъ. Кромѣ того, въ темнотѣ ихъ менѣе безпокоятъ мухи и комары. Наконецъ, должно избѣгать всего, что можетъ причинять животному испугъ или привести его въ гнѣвъ. Кроткое, ласковое обращеніе ускоряетъ откармливаніе.

О КОХИНХИНСКИХЪ КУРАХЪ, ИХЪ РАЗВЕДЕНІИ И ВЫГОДАХЪ, ДОСТАВЛЯЕМЫХЪ ИМИ.

Съ тѣхъ поръ, какъ эта порода куръ сдѣлалась извѣстна въ нашихъ хозяйствахъ, было очень много говорено и писано какъ за нее, такъ и противъ ея введенія. Да и до сего времени многіе любители домашней птицы еще не согласны между собою въ томъ, заслуживаетъ ли эта иностранная порода предпочтенія передъ обыкновенною; нѣкоторые утверждаютъ даже, что разведеніе ея доставляетъ менѣе выгодъ, чѣмъ содержаніе простыхъ домашнихъ породъ.

Рѣшить этотъ вопросъ въ ту или другую сторону можетъ только тотъ, кто самъ испыталъ на опытѣ ихъ разведеніе, занимался ихъ выращиваніемъ и уходомъ за ними, для чего, однакоже, необходимъ удобный случай. Очень многіе изъ такъ называемыхъ любителей кидаются съ жаромъ на всякую новинку и заводятъ у себя, часто съ большими издержками, животныхъ и птицъ иностранныхъ породъ, ни сколько не разбирая, что у нихъ нѣтъ даже удобнаго мѣста, чтобы помѣстить, напримѣръ, хотя курицу такимъ образомъ, какъ этого требуетъ ея природа; вслѣдствіе этого бѣдная птица вынуждена часто сидѣть безъ движенія въ какомъ нибудь темномъ углу или бродить по тѣсному и грязному двору, на который часто и не заглядываетъ солнце, столь необходимое для птицъ. Само собою разумѣется, что при такомъ содержаніи, совершенно противоположномъ привольному житью, которымъ онѣ пользуются на свободѣ, птицы хирѣютъ, ростутъ плохо, а, наконецъ, даже и умираютъ отъ различныхъ болѣзней. Любители, замучившіе такимъ образомъ купленныхъ ими за дорогую цѣну куръ, сваливаютъ, разумѣется, всю вину своей неудачи на породу и никакъ не хотятъ понять, что виновато только ихъ собственное

неблагоразуміе и неумѣнье. По этому, на успѣхъ въ этомъ дѣлѣ можетъ надѣяться лишь тотъ, у кого есть удобное мѣсто для содержанія дорогихъ куръ, на нѣсколько паръ которыхъ требуется пространство по крайней мѣрѣ въ нѣсколько сотъ футовъ, съ травою и кустарникомъ, а располагать такимъ мѣстомъ, въ особенности въ городахъ, могутъ только немногіе. Кромѣ того, желающій заняться разведеніемъ хорошихъ иностранныхъ породъ куръ, какъ, напримѣръ, кохинхинской, долженъ позаботиться объ устройствѣ просторнаго хлѣва и удобныхъ мѣстъ для насѣдокъ. Кто не въ состояніи удовлетворить этимъ главнѣйшимъ потребностямъ птицъ, тотъ пусть лучше и не принимается за ихъ разведеніе, потому что предпріятіе его не только не доставитъ ему желаемой прибыли, но даже введетъ въ напрасные убытки.

Яица кохинхинскихъ куръ крупнѣе яицъ обыкновенныхъ породъ; самыя малыя изъ нихъ равняются величиною самымъ крупнымъ отъ нашихъ куръ. Кромѣ того, они болѣе круглы, чѣмъ продолговаты; желтокъ у нихъ больше и вѣсъ ихъ гораздо значительнѣе, такъ что не рѣдко одно такое яйцо равняется по вѣсу двумъ обыкновеннымъ мелкимъ. Они жирнѣе и вкуснѣе обыкновенныхъ.

Кохинхинскія куры такія же хорошія насѣдки, какъ и наши; онѣ даже болѣе склонны къ насиживанію и выводятъ циплятъ, если это допустить, по три раза въ годъ. Но обыкновенно ихъ не допускаютъ до третьяго высиживанія, потому что это вредно для ихъ здоровья. Противники разведенія этой породы куръ утверждаютъ, что, при насиживаніи и выскакиваніи изъ гнѣзда, онѣ часто умерщвляютъ птенцовъ и что будто бы онѣ очень загрязняютъ гнѣзда своимъ пометомъ; но это совершенно несправедливо, какъ доказали многочисленные опыты. Если передъ гнѣздомъ поставленъ кормъ и чашка съ чистою водою для питья, то насѣдка сходитъ съ гнѣзда обыкновенно черезъ каждые два или три дня для испражненія, а потомъ снова немедленно возвращается въ гнѣздо. Подъ насѣдку не слѣдуетъ класть болѣе одиннадцати или тринадцати яицъ, потому что только тогда курица въ состояніи прикрыть ихъ своимъ тѣломъ надлежащимъ образомъ.

Кохинхинскія куры несутся очень прилежно. Въ Англіи, гдѣ эту породу начали разводить прежде другихъ странъ и гдѣ она сдѣлалась теперь столь же обыкновенною, какъ простая порода, получаютъ отъ одной курицы часто по девяносто четыре яица въ продолженіе ста трехъ дней. Одинъ хозяинъ получилъ отъ двадцати пяти курицъ въ теченіе одного года пять тысячъ четыреста сорокъ пять яицъ; слѣдовательно, на каждую изъ нихъ пришлось въ годъ по двѣсти осмьнадцати штукъ. Такъ прилежно не несется ни одна изъ извѣстныхъ породъ.

По вылупленіи птенцовъ, нужно немедленно вынуть изъ гнѣзда яичную скорлупу. Нѣкоторые птицеводы совѣтуютъ слишкомъ слабыхъ или больныхъ, только что вылупившихся изъ яйца, цыплятъ брать, изъ предосторожности, отъ насѣдки и сажать въ корзину или горшокъ съ перьями. Это, однакоже, очень ошибочно; если цыпленокъ очень слабъ, то онъ тамъ непремѣнно умретъ; часто онъ весь еще мокрый,

вслѣдствіе чего перья пристаютъ къ его тѣлу, облипаютъ глаза и клювъ, такъ что онъ отъ недостатка воздуха легко можетъ задохнуться. Естественная теплота матери необходима для успѣшнаго развитія птенцовъ; въ этомъ легко убѣдиться, наблюдая какъ они зарываются въ ея перья. Часто насѣдку можно поднять вверхъ и птенцы остаются висѣть въ перьяхъ, покрывающихъ ея брюхо. Всего лучше вылупившихся птенцовъ предоставить совершенно попеченіямъ матери; по прошествіи двухъ сутокъ, они уже будутъ въ состояніи выйти изъ гнѣзда и останутся бодры и здоровы. Первыя два, три дня имъ слѣдуетъ давать въ кормъ мелко изрубленныя сваренныя въ крутую яица съ тертымъ хлѣбомъ, а на четвертый этотъ кормъ можно уже замѣнить просомъ и мелко накрошеннымъ хлѣбомъ, смѣшаннымъ съ картофелемъ. По достиженіи четырнадцати-дневнаго возраста, они ѣдятъ уже всякій кормъ, который можетъ состоять изъ картофеля, ячменя, вареныхъ или моченыхъ хлѣбныхъ зеренъ и т. д. Кромѣ того, они могутъ отыскивать себѣ пищу также и на дворѣ на навозныхъ кучахъ.

Хлѣвъ, предназначаемый для кохинхинскихъ куръ, долженъ быть, какъ уже сказано выше, просторенъ и содержаться въ надлежащей опрятности. Полъ въ немъ слѣдуетъ посыпать ежедневно свѣжимъ пескомъ. Всего лучше, если двери въ него находятся въ уровень съ землею, потому что куры этой породы не любятъ лѣстницъ. Нашести и корзинки для гнѣздъ укрѣпляются у стѣнъ не много повыше пола. Хлѣвъ слѣдуетъ держать въ продолженіе дня открытымъ.

Кохинхинскія куры очень ручны и послушны, мало роютъ землю и вообще склонны къ болѣе тихому и спокойному образу жизни. Онѣ не перелетаютъ черезъ заборы, если послѣдніе имѣютъ отъ пяти до шести футовъ вышины, рѣдко выбѣгаютъ на улицу, даже въ такомъ случаѣ, когда ворота открыты, и никогда не отходятъ отъ дома такъ далеко, какъ наши обыкновенныя куры, часто перелетающія черезъ дома и очень высокіе заборы и причиняющія тѣмъ много хлопотъ. Всѣ эти качества заслуживаютъ особеннаго вниманія въ отношеніи сельскаго хозяйства.

Куры кохинхинской породы ростутъ очень скоро; не откормленныя годовалыя вѣсятъ отъ четырехъ до шести фунтовъ. Въ Англіи пѣтухи достигаютъ часто осьми фунтовъ вѣса. Жареное мясо ихъ, впрочемъ, не отличается особеннымъ вкусомъ, вареное же равняется въ этомъ отношеніи обыкновенному куриному.

Изъ всего сказаннаго объ этой породѣ слѣдуетъ, что она очень выгодна для разведенія и заслуживаетъ распространенія во всѣхъ хозяйствахъ. Единственный недостатокъ, въ которомъ ее можно упрекнуть, состоитъ въ томъ, что она не легко откармливается и жирѣетъ; но откармливаніе куръ, въ особенности у насъ, не составляетъ еще такой доходной статьи, чтобы этотъ недостатокъ можно было считать слишкомъ важнымъ.

ОБЪ ОТКАРМЛИВАНІИ ГУСЕЙ.

Извѣстно, что откармливаніе гусей производится во многихъ случаяхъ преимущественно

съ цѣлію добыванія ихъ печени, которая продается потомъ по дорогимъ цѣнамъ. Лучшимъ средствомъ для достиженія этой цѣли служитъ содержаніе откармливаемыхъ гусей въ тѣсныхъ, темныхъ хлѣвахъ и примѣшиваніе къ ихъ корму чеснока. Многіе, произведенные въ послѣднее время, опыты подтвердили успѣшное дѣйствіе этого растенія. Гусямъ, откармливаемымъ кукурузою, посредствомъ штопанья, давали при этомъ сперва черезъ день по одной луковицѣ чеснока, изрубленной на мелкіе кусочки. Отъ многихъ изъ этихъ гусей были получены потомъ отличныя большія печени, изъ которыхъ самая большая вѣсила тридцать лотовъ. Такой успѣхъ поощрилъ къ дальнѣйшимъ опытамъ и одному изъ гусей стали давать, вмѣстѣ съ кукурузою, такое же количество чеснока ежедневно. Успѣхъ превзошелъ ожиданія; печень убитаго гуся была изумительной величины и вѣсила одинъ фунтъ девять съ половиною лотовъ. Желательно, чтобы и другіе любители птицеводства испытали это простое средство, употребленіе котораго можетъ доставить такія выгоды при откармливаніи гусей для полученія крупныхъ печенокъ.

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМЪ МОЖНО УЗНАВАТЬ ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ, И СРЕДСТВА ПРОТИВЪ ОТРАВЛЕНІЯ ИМИ.

Ядовитые грибы бываютъ часто причиною отравленій и даже смерти, вслѣдствіе незнанія и неосторожности при употребленіи ихъ въ пищу. Такіе грибы можно узнавать по цвѣту покрывающей ихъ кожицы, испареніямъ и вкусу, свойственнымъ имъ въ сыромъ видѣ. Вотъ нѣсколько признаковъ, по которымъ ихъ можно отличить отъ съѣдобныхъ.

1. Зеленый, синій, сѣрно-желтый цвѣта не очень обыкновенны у грибовъ и могутъ служить знакомъ предостереженія. Почти тоже можно сказать и о цвѣтахъ; стоитъ вспомнить только о чемерицѣ, лютикѣ и т. п.

2. Черныхъ, растущихъ на поверхности земли грибовъ очень мало. Почти всѣ они ядовиты или по крайней мѣрѣ не годятся въ пищу, потому что мясо ихъ слишкомъ жестко. Подъ землею растетъ, напротивъ, много годныхъ въ пищу черныхъ грибовъ; таковы, напримѣръ, трюфели и другіе.

3. Ѣдкій, жгучій вкусъ не всегда еще служитъ признакомъ ядовитости растенія или гриба; хрѣнъ и можжевеловый грибъ, напримѣръ, въ сыромъ видѣ хотя и возбуждаютъ чиханіе, однакоже составляютъ если ихъ сварить, отличныя кушанья. Но если острота такъ сильна, что производитъ красноту кожи и не уменьшается даже послѣ обвариванія кипяткомъ, если съѣденные маленькіе сырые кусочки возбуждаютъ тошноту, производятъ ощущеніе тяжести и давленіе въ желудкѣ, то это вѣрные признаки, что грибъ принадлежитъ къ числу ядовитыхъ. Небольшой кусочекъ (величиною съ орѣхъ) даже самаго ядовитаго гриба можно съѣсть въ сыромъ видѣ, почти безъ всякой опасности для здоровья, такимъ образомъ можно испытывать вкусъ всѣхъ грибовъ.

4. Непріятный, похожій на издаваемый гнилыми яицами, запахъ, не пропадающій даже послѣ того, какъ грибъ сваренъ въ водѣ, служитъ

вѣрнымъ признакомъ негодности въ пищу. Такъ называемая волчья губка въ свѣжемъ видѣ также издаетъ непріятный, сладковатый запахъ; но если ее сварить, то этотъ запахъ исчезаетъ, тогда какъ ядовитые мухоморы удерживаютъ его и послѣ варенія въ водѣ.

5. Многіе грибы выростаютъ изъ земли окруженные бѣлою оболочкою. Эта пленка потомъ лопается и на шляпкѣ остаются небольшіе бѣлые клочки. Народъ считаетъ такіе грибы ядовитыми; дѣйствительно, только немногіе изъ нихъ могутъ быть употребляемы безъ вреда въ пищу.

Нѣкоторые думаютъ, что грибы, объѣденные насѣкомыми и другими животными, безвредны и для людей; но это совершенно не основательно: животныя могутъ употреблять въ пищу многія вещества, которыя положительно вредны для человѣка. Точно также не основательно мнѣніе, что будто бы луковица, варимая съ ядовитыми грибами, равно какъ и серебряная ложка, должны непремѣнно почернѣть. Стоитъ только сдѣлать опытъ надъ мухоморомъ, чтобы убѣдиться въ противномъ.

Припадки отравленія рѣдко обнаруживаются тотчасъ же послѣ употребленія въ пищу ядовитыхъ грибовъ; большею частію они начинаются по прошествіи нѣсколькихъ часовъ. Чаще всего при этомъ замѣчается рвота, поносъ, боль живота, судороги въ рукахъ и ногахъ; иногда эти болѣзненные припадки оканчиваются смертію. Почувствовавъ послѣ употребленія въ пищу грибовъ тошноту, должно немедленно стараться возбудить рвоту. Для этого надобно щекотать у больнаго въ горлѣ опушкою пера или просто пальцемъ и въ то же время давать ему пить побольше теплаго молока или теплой воды съ мыломъ, или овсянаго отвара. Если болѣзненные припадки не проходятъ и послѣ рвоты, то больному слѣдуетъ поставить промывательныя изъ теплой воды съ деревяннымъ масломъ или отваромъ льняныхъ сѣмянъ. Если же и послѣ этого больной не почувствуетъ облегченія, то ему нужно дать сильное слабительное. Вѣрнаго противоядія отъ отравленія грибами до сихъ поръ еще не открыто, хотя и испытано множество веществъ.

ЯИЧНОЕ МАСЛО КАКЪ ВРАЧЕБНОЕ СРЕДСТВО.

Добываемое изъ яичныхъ желтковъ масло составляетъ одну изъ лучшихъ мазей для залечиванія порѣзовъ, ушибовъ и разныхъ другихъ большихъ и малыхъ ранъ. Нужно изумляться съ какою быстротою закрываются помазанныя имъ раны, иногда, смотря по состоянію погоды, уже въ продолженіе трехъ или четырехъ дней. Масло это можетъ каждый приготовить самъ слѣдующимъ образомъ. Нужно взять два, три или болѣе желтка, смотря по тому, какое количество хотятъ имѣть масла, положить ихъ на обыкновенную сковороду и, раздавивъ ложкою, поджаривать на легкомъ огнѣ обыкновеннаго очага до тѣхъ поръ, пока они не начнутъ слегка пригорать. Когда желтки спекутся въ одну твердую массу, то отъ дѣйствія жара изъ нихъ начнетъ вытекать масло само собою. Разумѣется, что желтки, во время поджариванія, слѣдуетъ безпрерывно мѣшать ложкою, пока изъ нихъ не покажется масло. Изъ четырехъ желтковъ можно получить цѣлыхъ двѣ чайныхъ ложки яичнаго масла.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Октября 18 дня 1861 года. Ценсоръ *В. Бекетовъ.*

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.